

暗旋尺蛾 *Colostygia pendearia* (Oberthür, 1894) (图版 XIX: 12)

Anticlea pendearia Oberthür, 1894, Études d'Ent. 18: 39, pl. 5: 69. (四川: 打箭炉)

Cidaria phaiosata Staudinger, 1895, Dt. ent. Z. Iris 5: 337.

Cidaria (*Calostygia*) *pendearia*: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 232.

Cidaria (*Colostygia*) *pendearia*: Prout, 1938, ibidem 4 (Suppl.): 135.

Colostygia pendearia: Prout, 1939, ibidem 12: 267, pl. 26: k.




图 852—853 外生殖器. 852. 暗旋尺蛾 *Colostygia pendearia* (Oberthür), ♂; 853. 同前, ♀

前翅长: ♂ ♀ 15—17 mm。头黑褐色, 额毛簇发达; 胸腹部背面黑褐色与灰褐色掺杂。前翅浅灰褐至灰褐色, 带明显黄褐色色调, 亚基线、中线和外线黑色; 亚基线浅弧形, 其内侧色略深; 中线在前缘下方向外弯曲, 其下直立并微波曲; 中域散布黑褐色, 有两条波状伴线, 中点黑色, 小而圆; 外线浅波状, 直立或中部略外凸, 其外侧色浅, 有 2—3 条褐色伴线; 亚缘线白色锯齿状, 中部以下不完整或全部消失; 缘线在翅脉端两侧有一对黑点, 缘毛黄褐色, 在翅脉端深灰褐色。后翅白色, 中点黑色微小; 外线浅弧形, 模糊细带状, 在翅脉上加深形成小黑点; 缘线同前翅, 缘毛色较浅。翅反面浅灰褐色至灰褐色, 两翅均有浅弧形外线和黑褐色中点。

雄性外生殖器 (图 852): 钩形突粗大刺状。阳端基环近菱形, 底端深凹, 具一粗大腹突。阳茎基环侧突杆状, 端部具短毛刺。抱器瓣狭长, 抱器背弱骨化并具微小端突。囊形突宽大, 半圆形。阳茎中等大, 端膜粗糙。

雌性外生殖器 (图 853): 表皮突中等长。前阴片骨化, 碗状。囊导管短, 在囊颈处有一粗壮骨环。囊体大, 腹面中央有一片由微刺组成的囊片, 其周围弱骨化, 均近水滴形。

♂ 第八腹节腹板 (图 851: b): 鼓形, 侧缘中部凸出, 两下角凸伸出细长尖角。

检视标本: 2 ♀, 山西庞泉沟, 1988. VII. 7、17; 5 ♂ 5 ♀, 甘肃永登连城林场, 2 000—2 200 m, 1987. VII—VIII; 6 ♂ 10 ♀, 同前, 2 200 m, 1988. VI. 5—VII. 7; 34 ♂ 37 ♀, 青海祁连, 1977. VII. 28—31; 1 ♀, 青海湟中, 1977. VII. 16; 1 ♂, 四川汶川巴郎山, 3 800 m, 1979. V. 21; 1 ♂, 四川汶川卧龙, 1 920 m, 1982. VIII. 30; 1 ♂ 1 ♀, 同前, 1983. VII. 22、23; 1 ♀, 四川贡嘎山燕子沟, 2 350 m, 1983. VI. 9; 1 ♂ 1 ♀, 四川理县米亚罗, 2 700 m, 1983. VIII. 12; 1 ♂ 1 ♀, 四川泸定新兴, 1 900 m, 1983. IX. 4; 1 ♂, 四川康定, 2 600 m, 1983. V. 30; 1 ♂, 西藏类乌齐, 3 750 m, 1976. VIII. 18。

分布: 山西、甘肃、青海、四川、西藏; 朝鲜。

摈旋尺蛾 *Colostygia exceptata* (Sterneck, 1928)

Cidaria exceptata Sterneck, 1928, Dt. ent. Z. Iris 42: 127. (四川: 打箭炉)

Cidaria (Colostygia) exceptata: Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 135.

Colostygia exceptata: Prout, 1939, ibidem 12: 267.

额光滑, 具弱小额毛簇。下唇须较长, ♂ 触角栉齿较长。前翅紫褐色, 基部斑块白色, 中带白色不完整, 两侧有白点列, 亚缘线为一列白点, 均十分醒目。后翅白色, 具模糊中线和外线, 翅端部色略深。两翅均有深色中点。

未见标本。上文根据 Prout (1938、1939) 整理。模式标本 1 ♂ 翅展 43 mm。

分布: 四川。

假漆尺蛾属 *Pseudobaptria* Inoue, 1982 中国新记录

Pseudobaptria Inoue, 1982, Moths Japan 1: 474; 2: 278.

模式种: *Cidaria corydalaria* Graeser, [1889] (阿穆尔地区)

头胸腹部: 小型蛾类。额宽阔凸出, 光滑, 无额毛簇。喙发达。下唇须短小, 尖端伸达额外 (图 854: a)。♂ 触角双栉形 (图 854: b)。♀ 线形。前足正常 (图 854: c)。后足胫距两对, 各对内侧一支略长 (图 854: d)。胸部背面无立毛簇。

翅型: 前翅中等宽度; 前缘微呈浅弧形; 顶角钝圆; 外缘浅弧形; 臀角圆; 后缘平直。后翅狭长; 前缘长, 浅弧形; 顶角和臀角圆; 外缘中部凸出; 后缘平直。翅黑褐色, 前翅内线和中带白色, 后翅中部有大白斑。