

经济意义 豺作为一种猛兽,是许多资源动物及珍贵动物的天敌之一,特别是鹿类,受其威胁较大。

亚种

(1) 指名亚种 *Cuon alpinus alpinus* Pallas

1811 *Canis alpinus* Pallas, Zoogr. Ross. Asiat. 1: 34 (模式产地:苏联乌次考依奥斯特拉格附近)。

分布我国东北地区及苏联西伯利亚东部和萨哈林岛(即库页岛)。

据文献记载,本亚种体型较大,头骨之最大长191—200毫米,脑颅宽68.0—68.3毫米。冬毛毛色深红褐色。

豺在东北相当稀少。群众反映豺常聚集成群,在山上捕捉鹿,野山羊和狼为食,虎、豺很害怕它,人遇到豺也很危险,因此猎人从来不去打它*。

(2) 江西亚种 *Cuon alpinus lepturus* Heude

1892 *Anurocyon clamitans* Heude, Mem. H. N. Emp. Chin., 2, 2 (footnote), 102 (模式产地:江西鄱阳湖)。

分布于江西、安徽。

体形较小,头骨最大长167—174毫米,后头宽58.5—69.0毫米。毛色锈棕、口缘白色,尾稍染黑色,尾尖黑色。腹面白色而稍染赤色色调。毛色之深浅随季节或个体变异而有不同。有些个体腹部白色,有的则掺以赤红色调。

(3) 川西亚种 *Cuon alpinus? fumosus* Pocock

1936 *Cuon javanicus fumosus* Pocock, Proc. Zool. Soc. Lond. p. 49.

分布于四川。

据文献记述,毛被长而软,底绒长如同针毛。背部、颈部及尾部的针毛长度分别为65、80及105毫米。通色赤黄,背部深、乃由黑色毛尖所致。底绒烟灰,而非棕黄。颈部较灰。口须黑色。四肢赤色。尾部褐色而尾端较黑。后肢内侧和下部以及前肢基部白色。本亚种可能是江西亚种的同物异名。

(4) 克什米尔亚种 *Cuon alpinus laniger* Pocock

1936 *Cuon javanicus laniger* Pocock, Proc. Zool. Soc., p. 50 (模式产地:克什米尔地区)。

分布于西藏。

毛被较丰足,毛软而色浅。口须亦较淡。背、颈及尾毛长度分别为65、80及95毫米。底绒和针毛长度几乎相等。毛色赭黄,背毛较灰,颈侧毛色灰白,腹侧棕灰。耳及头顶毛色发棕。吻棕褐色。前肢外侧棕褐,往下渐转棕白。尾灰褐色。

Pocock (1936) 将拉萨标本订为本亚种。

* 据《东北兽类调查报告》。