

611. ——Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 411. ——Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 172. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 379.

翅展 37 mm。头部浅灰褐色，布有黑点，复眼外侧棕色，下唇须第一、二节外侧大部棕色，第三节灰黄色，细长，端部尖；胸部背面浅灰褐色，布有黑色细点，颈板中部有黑点，端部棕色，翅基片近端部有一黑褐色横线，前、中足胫节前缘有黑棕色条纹；前翅灰白色，布有黑棕色细长纹，前缘区微带褐色，一黑线自顶角直线内斜至 1 脉中部，其后稍曲，内侧有一细褐线与之平行，内方有多条细褐线，中部一线较粗，斜线外侧明显黑色，亚端线褐色，自顶角后微曲内斜，在 4 脉处内弯，其后较粗，后端达臀角，翅外缘有一列黑点，内侧另有一列黑点；后翅灰白色微带褐色，前缘区带有黄色，外半部密布褐色细纹，顶角区微黑；腹部淡褐灰色，背面布有黑点。

分布 湖南、福建、海南、江西、云南；印度或孟加拉国。

尺夜蛾 *Dierna patibulum* (Fabricius) (图版 LXV-26)

Noctua patibulum Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3: 89. (India Orientali)

Dierna acanthusalis Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 205.

Nahara clavifera Walker, 1865, List spec. lep. Colln Br. Mus. 33: 1004.

Dierna acanthusalis: Moore, 1884—87, Lep. Ceyl. 3: 188. ——Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 30.

Dierna patibulum: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 379.

翅展 30 mm。头部淡灰褐色，额两侧各有一棕色三角形斑，下唇须第二节外侧黑棕色，第三节灰黄色，细长，端部尖，触角有长鬃；胸部背面淡灰褐色，颈板向端部渐带黑棕色，前胸有一暗棕色斑；前翅淡灰褐色，布有暗褐色细纹，基线细，黑色，自前缘脉内斜至亚中褶，内线双线黑色，直线内斜，外一线后端为一黑点，中线黑色，与内线平行，外线黑色，自近顶角处直线内斜至 2 脉，其后成一三角形内突黑斑，亚端线隐约可见黑色，不规则波曲，中段外弯，在 2、3 脉处较明显成二黑斑，翅外缘有一列黑点；后翅淡黄褐色，顶角区微黑，翅外半布有黑色细纹；腹部淡褐黄色。

分布 广东、海南；印度，斯里兰卡，缅甸。

姗夜蛾属 *Latirostrum* Hampson

Latirostrum Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 68.

Type-species *Latirostrum bisacutum* Hampson.

喙发达，下唇须很长，向前平伸，第二节上缘有长毛，自基部向端部渐短，第三节端部呈匙状，雄蛾触角线形；胸部与腹部被平滑鳞片，足胫节饰毛；前翅长而窄，前缘基部拱曲，然后平直，翅外缘在顶角及 4 脉处缩成尖齿状，前翅 5 脉极弱，有一副室；