

## 尺夜蛾属 *Dierna* Walker

*Dierna* Walker, [1859] 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 16: 204.

Type-species: *Dierna acanthusalis* Walker.

*Nahara* Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 1004.

喙发达，下唇须向上弯，第二节长而宽，伸达头顶，第三节细尖，雄蛾触角有纤毛；胸部和腹部复鳞平滑；前翅三角形，顶角尖，外缘斜弯，臀角圆弯。

### 种 检 索 表

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. 前翅桃红色 .....        | 红尺夜蛾 <i>Dierna trimandra</i> |
| 前翅非桃红色 .....          | 2                            |
| 2. 前翅一斜线自顶角直达后缘 ..... | 斜尺夜蛾 <i>D. strigata</i>      |
| 前翅一斜线在亚中褶处内突成齿 .....  | 尺夜蛾 <i>D. patibulum</i>      |

### 红尺夜蛾 *Dierna timandra* Alpheraky (图版 LXV - 24)

*Dierna? timandra* Alpheraky, 1897, Mem. Lep. 9: 179, pl. 11, fig. 7. (朝鲜)

*Perynea pulcherina* [sic] Nagano, 1918, Ins. World 22: 449.

*Dierna timandra*: Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 234. ——Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 172. ——Ogata, 1958, in Esaki, Icon. Het. jap. p. 182. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 379.

*Naganoella timandra*: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 885.

翅展 27 mm。头部白色带有桃红色，触角暗褐色，下唇须灰黄色杂黑褐色；胸部桃红色，下胸与足外侧黑灰色；前翅桃红色，布有黑色细点，内线黄灰色，中有微白线，较直，微内斜，肾纹窄曲，黄灰色，前缘区外半部灰黄色，有白点，一灰黄斜带自顶角直线内斜至翅后缘近中部，其中有一白线，亚端线白色，微曲内斜，端线灰白色；后翅桃红色，布有黑色细点，前缘区灰黄色，内窄外宽，不达顶角，内线灰黄色，中有一白线，外线为灰黄色宽带，中有一白线，亚端线白色，自前缘区灰黄斑后外斜，4脉后内斜；腹部黑灰色，基节背面中央桃红色。

**分布** 黑龙江、吉林、河北、河南、浙江、湖南；日本，朝鲜。

### 斜尺夜蛾 *Dierna strigata* (Moore) (图版 LXV - 25)

*Phurys strigata* Moore, 1867, Proc. zool. Soc. Lond. p. 80. (Bengal)

*Dierna multistrigaria* Moore, 1882, Lep. Atk. p. 173.

*Dierna strigata*: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 30. ——Leech, 1900, Trans. ent. Soc. p.