

Diomea rotundata: Hampson, 1893, Ill. Het. 9: pl. 165, fig. 6. —Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 23. —Chen, 1985, Econ, Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 140. —Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.352.

翅展 32 mm 左右。头部、胸部与腹部黑褐色，雄蛾前足基节与腿节有一桃红色长毛束，中足胫节有桃红色毛，后足胫节有黑褐色毛；前翅黑褐色，基线与内线黑色，波浪形，不清晰，环纹黑色模糊，肾纹黑色，中线隐约可见黑色，在中室后内斜，外线黑色，锯齿形外弯，前端外侧有一淡黄色锯齿形斜纹，翅外缘一系列黑点；后翅黑褐色，基部色较淡，横脉纹黑色，中线黑色，仅在中室后可见，外线黑色锯齿形，中段外弯，后段外侧有一赭黄色杂紫红色斑，亚端线黑色，不清晰，前半内方微带红色，翅外缘有一系列黑点，翅后缘及缘毛褐灰色，外缘毛黑褐色。

分布 西藏；锡金，印度，斯里兰卡。

白纹狄夜蛾 *Diomea discisigna* Sugi (图版 LIX-26)

Diomea discisigna Sugi, 1963, Tinea 6: 28, figs. 5, 8. (日本)

Diomea discisigna: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 883.

翅展 25 mm。头部与胸部黑褐色；前翅黑褐色，基线白色，自前缘脉外弯至 1 脉，内线仅在中室前现一白曲纹，在中室后现一白点，肾纹为一模糊小白斑，外线前端为一白斑，其后为一列白点，约排成锯齿形，亚端线由一系列白点组成，后端靠近外线，翅外缘有一列白点；后翅黑褐色，外线由一系列白点组成，在亚中褶之后融合成一白曲纹，亚端线只现一系列白点，翅外缘亦有一列白点；腹部黑褐色。

分布 云南；日本。

星狄夜蛾 *Diomea cremata* (Butler) (图版 LIX-27)

Capnodes cremata Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 1: 295. (日本横滨)




图 647 星狄夜蛾 *Diomea cremata* (Butler) ♂ 外生殖器

Diomea cremata: Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 23. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 369. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 366. —Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 883.

翅展 25 mm。全体黑褐色；前翅基线白色外弯至 1 脉，内线仅前端现一白曲纹，中室后一白点，肾纹为模糊小白斑，外线前端为一白斑，其后为一列白点，亚端线为一列白点，端线亦为一列白点；后翅外线为一列白点，后端融合成一白曲纹，亚端线为一列白点，翅外缘一列白点。雄蛾抱器腹延伸为一长突，瓣端半部较窄（图 647）。

分布 黑龙江、河北、云南；日本，朝鲜，印度。

仿爱夜蛾属 *Apopestes* Hübner

Apopestes Hübner, [1823] 1816, Verz. bek. Schmett. p. 275.

Type-species: *Noctua spectrum* Esper.

Spintherops Boisduval, 1840, Ind. Meth. p. 98.

喙发达，额微凸，上缘有一毛簇，下唇须向上伸，第二节有粗而密的毛，第三节向前伸，尖，前端微弯，雄蛾触角有纤毛丛；胸部及腹部鳞片平滑，下胸及足的腿节有绒毛；前翅前、后缘长度相近，顶角钝，外缘弧形。幼虫四对腹足俱全，身体细，取食蝶形花科植物，在细枝或枯叶中结薄茧化蛹。

吉仿爱夜蛾 *Apopestes centralasiae* Warren (图版 LIX-28)

Apopestea centralasiae Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 370, pl. 68b. (克什米尔；Kirgiz；Issykul；阿富汗)

翅展 60—66 mm。头部灰黄色杂黑褐色；颈板黑褐色，端部灰黄色，胸部背面灰黄色，翅基片基部浅黄色，有黑横纹，足灰黄色杂黑褐色，胫节端部及跗节各节间有灰黄斑；前翅灰黄色，布有黑褐细纹，前缘区色浅，基线黑褐色，外侧衬灰白色，自前缘脉外斜至中室后缘，内线黑褐色，锯齿形外弯，在前缘区及中室后较粗，中线黑褐色，在前缘区为一外斜纹，其后微弱，外斜至中室后缘，折角内斜并呈微波浪形，肾纹不明显，中有黑褐圈，外线黑褐色，在前缘脉上为一粗黑点，其后波浪形外弯，至 3 脉处内突达肾纹后端，折角后垂，亚端线灰白色，有间断，不规则波曲，在 2 脉后内弯，线内侧衬黑褐色，在亚中褶处有一黑褐斑，1 脉处有一黑褐小斑，翅外缘有一列黑点；后翅灰黄色微带褐色，端区色较暗，隐约可见黑褐色外线，缘毛浅褐黄色；腹部浅褐黄色。

寄主 苦豆子。

分布 新疆、宁夏、四川、西藏；克什米尔地区，中亚地区，阿富汗。