

Diomea rotundata: Hampson, 1893, Ill. Het. 9: pl. 165, fig. 6. —Hampson, 1895, Fn. Br. Ind. 3: 23. —Chen, 1985, Econ, Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 140. —Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.352.

翅展 32 mm 左右。头部、胸部与腹部黑褐色，雄蛾前足基节与腿节有一桃红色长毛束，中足胫节有桃红色毛，后足胫节有黑褐色毛；前翅黑褐色，基线与内线黑色，波浪形，不清晰，环纹黑色模糊，肾纹黑色，中线隐约可见黑色，在中室后内斜，外线黑色，锯齿形外弯，前端外侧有一淡黄色锯齿形斜纹，翅外缘一列黑点；后翅黑褐色，基部色较淡，横脉纹黑色，中线黑色，仅在中室后可见，外线黑色锯齿形，中段外弯，后段外侧有一赭黄色杂紫红色斑，亚端线黑色，不清晰，前半内方微带红色，翅外缘有一列黑点，翅后缘及缘毛褐灰色，外缘毛黑褐色。

分布 西藏；锡金，印度，斯里兰卡。

白纹狄夜蛾 *Diomea discisigna* Sugi (图版 LX - 26)

Diomea discisigna Sugi, 1963, Tinea 6: 28, figs. 5, 8. (日本)

Diomea discisigna: Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 883.

翅展 25 mm。头部与胸部黑褐色；前翅黑褐色，基线白色，自前缘脉外弯至 1 脉，内线仅在中室前现一白曲纹，在中室后现一白点，肾纹为一模糊小白斑，外线前端为一白斑，其后为一列白点，约排成锯齿形，亚端线由一列白点组成，后端靠近外线，翅外缘有一列白点；后翅黑褐色，外线由一列白点组成，在亚中褶之后融合成一白曲纹，亚端线只现一列白点，翅外缘亦有一列白点；腹部黑褐色。

分布 云南；日本。

星狄夜蛾 *Diomea cremata* (Butler) (图版 LX - 27)

Capnodes cremata Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 1: 295. (日本横滨)




图 647 星狄夜蛾 *Diomea cremata* (Butler) ♂ 外生殖器