

线黑色，锯齿形，内侧有一列黑点；腹部浅褐色。

分布 湖南；日本。

观察标本 桑植天平山 1300 m。1988. VII. 11. 仅 1 头。

狄夜蛾属 *Diomea* Walker

Diomea Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1109.

Type-species: *Diomea rotundata* Walker.

Zigeru Walker, 1862, J. Linn. Soc., Zool. 6: 182.

Heteroscotia Bryk, 1949, Ark. Zool. 41 (A) 1: 138.

喙发达，下唇须向上伸，不超过头顶，雄蛾触角线形；后胸有毛簇；腹部基部几节背面有毛簇；前翅顶角较圆钝；后翅臀角完整，钝圆。

种 检 索 表

1. 前翅前缘区近中部一斗形黑斑 黑斑狄夜蛾 *Diomea jankowskii*
- 前翅前缘区无黑斑 2
2. 雄蛾前足基节和腿节间有长毛簇 狄夜蛾 *D. rotundata*
- 雄蛾前足基节和腿节间无长毛簇 3
3. 前翅前缘区近中部有白斑 白缘狄夜蛾 *D. discisigna*
- 前翅前缘区近中部只有白点 星狄夜蛾 *D. crenata*

黑斑狄夜蛾 *Diomea jankowskii* (Oberthür) (图版 LIX - 24)

Capnodes jankowskii Oberthür, 1880, Et. ent. 5: 87, pl. 9, fig. 1. (Askold 岛)

Capnodes jankowskii: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 369.

Diomea jankowskii: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 883.

翅展 31 mm。头部黑褐色，颈板黄褐色；胸部红棕色；前翅褐灰色，外线内方的前缘区及部分中室黄褐色，内区与端区带红棕色，基线、外线黑色，内线、中线棕色波曲，后者仅后半可见，外线在 8 脉前直线外斜，其后锯齿形，后半外侧一列黑点，端线浅黄色间断，内侧一列黑褐点；后翅暗褐灰色，内半布有黑褐细点，亚端线外方棕色，中线黑褐色，不明显，外线黑色锯齿形，外侧衬间断的白色，亚端线浅黄色，内侧一列黑褐点；腹部棕色。

分布 黑龙江；日本，朝鲜。

狄夜蛾 *Diomea rotundata* Walker (图版 LIX - 25)

Diomea rotundata Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1110. (斯里兰卡)