

Daseochaeta discibrunnea: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 32, pl. 123, fig. 22. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 240, pl. 76, fig. 1745.

Diphtherocome discibrunnea: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 34, pl. 5e

翅展 38—41mm。头、胸浅黄绿或褐黄色，颈板与翅基片边缘较褐；前翅黄色或浅绿色，有细黑点，基线、内线、外线均双线，基线与内线在中室后相连成马蹄形，剑纹、环纹及肾纹有白环及黑边，环、肾纹间有一方形黑斑，并伸至前缘脉，外线外侧有一褐带，亚端线白色，外侧一列黑点；后翅浅黄色，外线及端带暗褐色；腹部浅黄褐色。

分布 四川；锡金，印度。

黑条青夜蛾 *Diphtherocome marmorea* (Leech) (图版IV-22)

Diphthera marmorea Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 136. (中国西部: Pu-tsu-fong)

Daseochaeta marmorea: Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 33, pl. 123, fig. 23. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 240, pl. 76, fig. 1746.

Diphthera marmorea: Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 11, pl. 2b.

翅展 36mm。头部浅土黄色或浅绿色；前翅浅绿色或黄绿色，基线为黑曲条，内线黑色，在 1 脉后为一黑环，剑纹为黑色曲点，环、肾纹有不完整的黑边，两纹间有黑方斑，外线双线黑色，锯齿形，在前缘脉上为粗点状，亚端线黑色，与外线间成一黑色宽带，前端二白点；后翅浅黄色，外线、亚端线及端区微黑；腹部浅褐色。

分布 陕西、四川、云南。

云青夜蛾 *Diphtherocome metaphaea* (Hampson) (图版IV-23)

Daseochaeta metaphaea Hampson, 1909, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 8: 23, pl. 123, fig. 19. (中国西部: Pu-tsu-fong)

Daseochaeta metaphaea: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40, 4.

翅展 30mm。头、胸及前翅翠绿色，颈板外缘黑色，胸背有成双的黑点，前翅基线仅现黑色三角形纹于前端，一黑纹自前缘脉基部外斜至亚中褶折向外，内线黑色，后端与出自翅基部的黑条相合于 1 脉前，剑纹箭头形，环纹近圆形，肾纹短宽，外缘锯齿形，两纹间一黑方斑，中线仅前后端各现一黑斑，亚中褶有一长方黑斑，其内缘二叉，外线黑带状，亚端线不显；后翅黑褐色，亚端带浅绿色；腹部浅褐色。

分布 云南。

斋夜蛾属 *Gerbathodes* Warren

Gerbathodes Warren, 1911, in Seitz, Gross-Schmett. Erde 3: 175.