

图 91—92 雄性外生殖器. 91. 褐盗尺蛾 *Docirava brunnearia* (Leech);  
92. 台湾盗尺蛾 *D. flavilinata* Wileman

### 台湾盗尺蛾 *Docirava flavilinata* Wileman, 1915 (图版 II: 16)

*Docirava flavilinata* Wileman, 1915, Entomologist 48: 17. (台湾)

前翅长: ♂ 17 mm。胸腹部腹面粉红色较少, 头和体背色较灰。前翅翅型近似褐盗尺蛾, 翅面深灰色, 基部隐见亚基线残迹, 粉红色仅见于前缘; 内外线特别粗壮, 极鲜明, 内线内半黄色, 外半深黄褐色, 微呈浅弧形弯曲; 外线颜色相反, 上端向外倾斜, 在  $Cu_2$  处向外弯曲; 中点黑色与深黄褐色掺杂; 外线与外缘之间可见十分模糊的浅色亚缘线, 不波曲; 缘毛基半部灰色, 端半部白色, 稍带粉红色。后翅污白至污黄色。前翅反面深灰褐色, 外线外侧色较浅, 内外线隐约可见; 前缘黄色, 至顶角扩宽, 其内下方带粉红色, 但远较前述种类为少。后翅反面污黄色, 散布深灰褐色和粉红色。

雄性外生殖器 (图 92): 钩形突较长, 端部略展宽呈匙形。阳端基环较长。囊形突略短宽。抱器瓣较前述种类短宽, 抱器背无端突, 其下方亦无褶; 抱器内突弱小。

检视标本: 1 ♂, 台湾南投, 1974. VIII. 7 (日本 Inoue 博士赠送标本)。

分布: 台湾。

### 斜线盗尺蛾 *Docirava aequilineata* Walker, [1863] 1862 中国新记录 (图版 II: 17)

*Docirava aequilineata* Walker, [1863] 1862, List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus. 26: 1635.  
(印度: North Hindostan)

*Anaitis aequilineata*: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 341.




图 93—94 雄性外生殖器. 93. 斜线盗尺蛾 *Docirava aequilineata* Walker;  
94. 玉带盗尺蛾 *D. fulgurata* (Guenée)

前翅长: ♂ 16—17 mm, ♀ 17 mm。下唇须较其它种略短。胸腹部腹面粉红色较少。前翅翅型同褐盗尺蛾, 几乎不带粉红色 (有时前缘略带粉红色, 这时缘毛也带粉红色); 内线内半和外线外半浅黄色宽阔, 外线上端伸达顶角, 十分倾斜; 中点黑褐色。后翅白色。前翅反面灰褐色, 隐见正面斑纹; 前缘附近和外线外侧灰黄色, 顶角附近散布粉红色鳞。

雄性外生殖器 (图 93): 钩形突长刺状, 端部不膨大。阳端基环上端有一对小尖突。抱器瓣狭长; 抱器背中部微隆起, 无突; 抱器腹宽大, 向内折叠, 边缘不整齐, 端部延伸出抱器瓣端部之外, 使整个抱器瓣呈船形。

检视标本: 1 ♂ 1 ♀, 云南官渡双龙, 2 100—2 300 m, 1980. VII. 6、9; 1 ♂, 云南碧谷, 2 500 m, 1980. VI. 27。

分布: 云南; 印度。

### 玉带盗尺蛾 *Docirava fulgurata* (Guenée, 1857) (图版 II: 18)

*Anaitis fulgurata* Guenée, 1857, in Boisduval & Guenée, Hist. nat. Insectes (Spec. gén. Lépid.) 10: 498. (印度)

*Anaitis macrocelata* Walker, 1862, List Specimens lepid. Insects Colln Br. Mus. 25: 1447.

*Orsonoba* (?) *medmaria* Walker, [1863] 1862, ibidem 26: 1521.