

翅展 40 mm。头部与胸部浅褐黄色杂黑灰色；前翅褐灰色，内线双线黑灰色，微波曲外斜，在前缘区为双点状，线内方色暗，中线不显，前缘区中部有一模糊黑灰斑，肾纹极不清晰，隐约可见黑灰色轮廓，外线隐约可见，在中褶处内弯，肾纹与外线间浅褐黄色，似成一葫芦状斑，前方有一模糊黑灰纹，亚端线灰黄色，锯齿形，在亚中褶处内弯，缘毛黄白色，中有一褐线；后翅浅褐色，横脉纹黑褐色，新月形，外区有一黑褐带，其外缘在中褶处外凸，在 2—3 脉间内弯，带的后半内侧有一暗褐线，端区近顶角有一暗褐斑，2—5 脉间有一近卵形黑褐斑；腹部浅褐色。雄蛾钩形突长，端部尖，抱器瓣长，端半部宽，端缘钝圆，抱器腹的腹侧较厚，近达瓣端，抱钩长指形，抱器内突短，阳茎小，无角状器（图 675）。




图 675 鹞妃夜蛾 *Drasteria scolopax* (Alpheraky)

♂ 外生殖器

分布 青海、新疆。

塞妃夜蛾 *Drasteria catocalis* (Staudinger) (图版 LXIV-2)

Euclidia catocalis Staudinger, 1882, Stett. ent. Zeit. 43: 52. (Lepsa; Saisan)

Aleucanitis catocalis: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 390. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 374.

Leucanisit catocalis: John, 1910, Hor. Soc. ent. ross. 39: 614, pl. 17, figs. 2b, c, 3b; pl. 20, fig. 11 male genitalia.

翅展 40 mm。头部与胸部褐色；前翅淡褐黄色，密布黑棕色细点，基线双线黑棕色，波浪形，自前缘脉至亚中褶，内线双线黑色，波浪形，线间黑棕色，微外斜，中线细，暗褐色，肾纹弯钩形，黄灰色，黑边，外线黑棕色，锯齿形，自前缘脉后外弯，在

3脉处内伸达肾纹后端折向后行，外侧暗褐色，亚端线灰黄色，内侧衬暗褐色，并有几个黑棕色锯齿形纹，不规则锯齿形外弯，4脉后内斜，2脉后内弯，端线黑色，波浪形；后翅淡褐黄色，翅脉纹褐色，横脉纹黑色窄曲，亚端区有一黑褐色曲带，2—5脉端部之间有一黑棕色椭圆形斑；腹部黄灰色。

分布 新疆、甘肃；中亚地区。

寒妃夜蛾 *Drasteria caucasica* (Kolenati) (图版 LXIV-3)

Euclidia caucasica Kolenati, 1847, Ins. Caucasi p.104, pl. 18, fig. 4. (西班牙; Caucaso Lhegi-co)

Ophiusa astrida Eversmann, 1857, Bull. Soc. Imp. nat. Mosc. 30 (4): 399.

Leucanitis caucasica: John, 1910, Hor. Soc. ent. ross. 39: 618.

Aleucanitis caucasica: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 392. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 374.

翅展 35 mm。头部与胸部褐灰色杂有少许黑色；前翅灰色，外线与亚端线之间棕色，基线黑色，自前缘脉至亚中褶，稍外斜并有间断，内线黑色，自前缘脉至中室后缘较模糊细弱，中室后粗而内斜，成一窄带，肾纹黑色，小而模糊，外线黑色，自前缘脉后外弯，至中褶处内弯，在 5、6 脉处各成一外凸小齿，然后内斜至肾纹后再折向后行，后端外斜，内线与外线之间褐白色，中有一棕色带，亚端线双线浅棕色，波浪形，自近顶角处内斜 3 脉后不明显，翅外缘有一列黑点；后翅白色带浅褐色，横脉纹黑色模糊，亚端区有一黑色宽带，自前缘外斜至 6 脉折角内斜，至 2 脉处内突，折角外斜达臀角，端区中部有一黑色近椭圆形斑；腹部灰色有黑点。

寄主 沙枣。

分布 新疆；欧洲。

包夜蛾属 *Marsipiophora* John

Marsipiophora John, 1909, Revue russe Ent. 9: 117.

Type-species: *Calophasia christophi* Erschov.

喙发达，下唇须短，第二节向上伸，第三节短，向前平伸，雄蛾触角线形，有短鬃毛；胸部被粗鳞片，无毛簇；前足胫节短，有一发达端爪，中、后足胫节有毛簇；前翅有一副室；后翅 5 脉较弱。

包夜蛾 *Marsipiophora christophi* (Erschov) (图版 LXIV-4)

Calophasia christophi Erschov, 1847, Fedtsch. Reise 5: 46, pl. 3, fig. 44. (Kisil-kum 沙漠)

Marsipiophora christophi: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 395.