

躬妃夜蛾 *Drasteria flexuosa* (Ménétriès) (图版 LXIII-31)

Ophiusa flexuosa Ménétriès, 1848, Mem. Acad. Imp. Soc. St. -Petersb. 6: 76, pl. 6, fig. 5.
(乌兹别克)

Ophiusa singularis Kollar, 1849, Ins. Pers. p. 12.

Thyria inepta Butler, 1881, Proc. zool. Soc. fig. 620.

Aleucanitis flexuosa: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 389, pl. 70g. —Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 230. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 374.

Leucanitis flexuosa: John, 1910, Hor. Soc. ent. ross. 39: 616.

翅展 35 mm。头部与胸部淡褐色杂深褐色，颈板中部杂有黑色；前翅淡褐色，密布黑色细点，外线外方色较深，基线黑色，自前缘脉外斜至亚中褶，稍间断，内线黑色，波浪形，自前缘脉外斜至亚中褶折角内斜，环纹不显，肾纹黑褐色，边缘不清，前方有双外斜黑纹及一内斜黑纹，外线黑色，自前缘脉后外弯，至 3 脉基部折向后行，有间断，亚端线黄白色，大波浪形，在 7 脉及 2—5 脉间外弯，内侧暗褐色，前段内侧成肾形黑褐斑，亚端区翅脉黑色；后翅白色，外半一大黑斑，顶角及 2 脉端白色，中脉及 2、3 脉基部黑色；腹部黄白色，各节间浅褐色。雄蛾抱器腹延伸成突，左右瓣的突异形，阳茎短 (图 672)。




图 672 躬妃夜蛾 *Drasteria flexuosa* (Ménétriès) ♂ 外生殖器

分布 新疆；蒙古，中亚地区。

灰妃夜蛾 *Drasteria hyblaeoides* (Moore) (图版 LXIII-32)

Heliothis hyblaeoides Moore, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5; 1: 234. (Yarkund Chiklik)

Aleucanitis hyblaeoides: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 392. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 145.