

巨齿，端区中部有一模糊三角形黑斑；腹部暗褐灰色。

**分布** 新疆、甘肃。

**淡妃夜蛾 *Drasteria indecora* (John) (图版 LXIII-35)**

*Leucanitis indecora* John, 1910, Rev. russ. ent. 9: 429, figs. 1, 2; 5, 6. (Syr-darja)

*Leucanitis indecora*: John, 1910, Hor. Soc. ent. russ. 39: pl. 18, figs. 4b, 5a.

*Aleucanitis indecora*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 392.

翅展 30 mm。头部与胸部灰白色杂黑色，颈板中部及翅基片内缘各有黑色纵条；前翅灰白色，密布黑细点，翅脉纹黑色，内线双线黑色，内一线粗，波曲外斜，中线黑色，自前缘脉外斜至中室下角，折角内斜，外线隐约可见双线黑色，自前缘脉外弯，在中褶处内凹，3脉后内伸，其后不显，线前半的内侧色较浅，似成一大肾形斑，亚端线黑色，外侧衬灰白色，在7脉处外凸，中段外弯，端线黑色，锯齿形，在各翅脉间为黑点，缘毛灰白色杂黑色；后翅白色，中室带有黑灰色，横脉纹黑色，端半部黑色，端区在中褶及亚中褶处各有一小白斑，缘毛白色，中有一列模糊黑灰点；腹部暗灰色。

**分布** 新疆；中亚地区。

**西妃夜蛾 *Drasteria kusnezovi* (John) (图版 LXIII-36)**

*Leucanitis kusnezovi* John, 1910, Hor. Soc. ent. ross., 39: 606, pl. 16, figs. 6b, c; 7a. (哈萨克斯坦；锡尔河)

*Aleucanitis kusnezovi*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 391. —Draudt, 1936, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 230, pl. 24e.

翅展 31 mm。头部灰色，额有突起，下唇须第二节外侧有黑褐纹；颈板灰色，外中部有黑纹，胸部背面褐灰色，下胸浅灰色，足跗节外侧黑褐色，各节间有灰白斑；前翅灰色带褐，基线双线黑色，波浪形，自前缘脉外斜至亚中褶，内线双线黑色，大波浪形，内一线在中室前缘及中室后各有一内突纵纹，线内侧带有黑褐色，中线隐约可见褐色，环纹不显，肾纹内缘直，黑色衬黄白色，外缘不规则锯齿形，外线黑色，在前缘脉后大锯齿形外斜，4脉后强内伸达中室下角，折向后行，微波浪形并稍外斜，亚端线黑色大波浪形，双线，内一线在3脉前有一列楔形黑纵纹，2脉后细锯齿形，外一线大部不明显，色亦较浅，端线黑色，波浪形，缘毛中部有一黑褐线；后翅白色，横脉纹明显，黑色，其后端与端区的黑色宽带连接，端带的内缘在2脉处强内突，外缘在顶角、中褶及2—3脉间均不达翅外缘，空出端区的白色，成斑状，中段的缘毛带有黑色；腹部褐灰色。

**分布** 新疆；哈萨克斯坦。