

元妃夜蛾 *Drasteria obscurata* (Staudinger) (图版 LXIII-37)

*Leucanitis obscurata* Staudinger, 1888, Stett. ent. Z. 49: 55. (Saisan; Margelan)

*Leucanitis obscurata*: John, 1910, Hor. Soc. ent. russ. 39: 611.

*Aleucanitis obscurata*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 391. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 144.

翅展 38 mm。头、胸赭白色；前翅浅灰带赭黄色，基线、内线及外线黑色，基线、内线间另有二黑褐线，肾纹黑色，前后端均外突，中线褐色外斜，外线在 7、4、3 脉为外突齿，亚端线赭黄色，内侧一列黑齿纹，4 脉后一列新月形黑纹；后翅黄白色，中室及后缘区微褐，端区一暗褐宽带，亚端区 2—4 脉间一黄白曲纹；腹部赭白色。雄蛾抱器腹延伸成长尖突，抱钩指形，瓣背侧另有长弯突（图 673）。




图 673 元妃夜蛾 *Drasteria obscurata* (Staudinger) ♂ 外生殖器

分布 新疆；中亚地区。

赫妃夜蛾 *Drasteria herzi* (Alpheraky) (图版 LXIII-38)

*Leucanitis herzi* Alpheraky, 1895, Iris, 8: 198. (土库曼)

*Aleucanitis herzi* ssp. *angustifasciata* Amsel, Ver. Dtsch. Kol. Ueb. Mus. Bremen, 1: 238.

*Leucanitis herzi*: John, 1910, Hor. Soc. ent. ross. 39: 608.

*Aleucanitis herzi*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 391. —Draudt, 1936, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 230.

翅展 35 mm。头部、胸部与前翅浅灰褐色，前翅内线双线黑色，大波浪形，内一线弱，中线细弱，外线双线，内一线黑色，外一线暗褐色，前半不规则锯齿形外斜，3 脉后强内突，至中室下角折向后行，亚端线双线黑色，内一线明显，并稍向内渗散，不规则锯齿形，端线黑色；后翅白色，外半黑色，中室基部与亚中褶各有一黑纵纹，横脉