

翅展 30 mm。头部淡红褐色，下唇须灰色，基部白色；胸部背面淡红褐色，足外侧黑色，有白斑；前翅暗灰色，内线内方带有红褐色，基线黑色，自前缘脉至中室后缘，内线双线黑色，波浪形，外一线明显，外方有一灰色宽带，肾纹褐色白边，内外侧中部凹，外线黑色，不整齐锯齿形，自前缘脉后外弯，至 3 脉处斜伸至肾纹后端，再折向后行，亚端线白色，细波浪形，前半内侧色较暗，中段外弯；后翅白色，基部与后缘带褐色，横脉纹窄长，黑色，与端区黑宽带相连，顶角、中褶端部各一小白斑，1、2 脉端之间一白纹；腹部灰色。雄蛾抱器瓣端半部宽，抱钩长，微弯（图 669）。

分布 内蒙古；蒙古，欧洲。




图 669 罗妃夜蛾 *Drasteria rada* (Boisduval) ♂ 外生殖器

秀妃夜蛾 *Drasteria picta* (Christoph) (图版 LXIII-29)

Leucanitis cailino var. *picta* Christoph, 1877, Hor. Soc. ent. ross. 12: 257. (伊朗)

Leucanitis picta: John, 1910, Hor. Soc. ent. ross. 39: 604. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3. 341. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 360.




图 670 秀妃夜蛾 *Drasteria picta* (Christoph) ♂ 外生殖器

翅展 28 mm。头部褐色杂白色及少许黑色，下唇须白色带褐灰色；胸部背面褐色杂白色及少许黑色，下胸与足白色，后者带褐灰色，前足胫节端部有双较长的爪；前翅褐色杂有少许白色，基部色略浅，前缘区色较黑，基线双线黑色，自前缘脉至中室后

缘，有间断，内线双线黑色，波曲外斜，外一线较直，环纹不显，肾纹黄白色，中有黑圈，外线黑色，自前缘脉后外斜至6脉，折向后行，在3、4脉处成外凸细齿，然后内伸至3脉基部再折向后，微曲并稍外斜，内线与外线之间大部黄白色，外区前缘脉上有黑褐纹，亚端线白色，在6—7脉及2—5脉间外弯，线内侧有细锯齿形黑斑纹及黑线，外侧另一黑线；后翅白色，后缘微褐，横脉纹黑褐色，与端区黑褐宽带相连，2—3脉端部一白斑，中褶端一白纹；腹部浅褐灰色。雄蛾抱器瓣背腹缘中段稍凹，左右瓣的抱钩异形（图670）。

分布 新疆；伊朗。

古妃夜蛾 *Drasteria tenera* (Staudinger) (图版 LXIII-30)

Leucanitis tenera Staudinger, 1877, Stett. ent. Zeit. 38: 194. (俄罗斯南部)

Leucanitis tenera: John, 1910, Hor. Soc. ent. ross. 39: 619, figs.

Aleucanitis tenera: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 390. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 374.




图 671 古妃夜蛾 *Drasteria tenera* (Staudinger) ♂ 外生殖器

翅展 33 mm。头部与胸部黑褐色杂灰白色；前翅灰色，布有黑色细点，基线与内线均不显，肾纹灰色，黑边，后端沿中室后缘稍内突，内侧的中室上有一暗黄斑，外线黑色，锯齿形，自前缘脉后外弯，至3脉处内伸达肾纹后端再转向外斜，外线内侧明显暗黄色，外线外方黑棕色，端线黑色；后翅白色，外半部黑褐色，3—4脉端部有一黑色近圆形斑，其周围白色；腹部灰色。雄蛾钩形突粗，抱器瓣的抱器腹向腹侧延伸成长突，抱钩长，阳茎短，无角状器（图671）。

分布 内蒙古、新疆；俄罗斯。