

缘，有间断，内线双线黑色，波曲外斜，外一线较直，环纹不显，肾纹黄白色，中有黑圈，外线黑色，自前缘脉后外斜至6脉，折向后行，在3、4脉处成外凸细齿，然后内伸至3脉基部再折向后，微曲并稍外斜，内线与外线之间大部黄白色，外区前缘脉上有黑褐纹，亚端线白色，在6—7脉及2—5脉间外弯，线内侧有细锯齿形黑斑纹及黑线，外侧另一黑线；后翅白色，后缘微褐，横脉纹黑褐色，与端区黑褐宽带相连，2—3脉端部一白斑，中褶端一白纹；腹部浅褐灰色。雄蛾抱器瓣背腹缘中段稍凹，左右瓣的抱钩异形（图670）。

分布 新疆；伊朗。

古妃夜蛾 *Drasteria tenera* (Staudinger) (图版 LXIII-30)

Leucanitis tenera Staudinger, 1877, Stett. ent. Zeit. 38: 194. (俄罗斯南部)

Leucanitis tenera: John, 1910, Hor. Soc. ent. ross. 39: 619, figs.

Aleucanitis tenera: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 390. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 374.




图 671 古妃夜蛾 *Drasteria tenera* (Staudinger) ♂ 外生殖器

翅展 33 mm。头部与胸部黑褐色杂灰白色；前翅灰色，布有黑色细点，基线与内线均不显，肾纹灰色，黑边，后端沿中室后缘稍内突，内侧的中室上有一暗黄斑，外线黑色，锯齿形，自前缘脉后外弯，至3脉处内伸达肾纹后端再转向外斜，外线内侧明显暗黄色，外线外方黑棕色，端线黑色；后翅白色，外半部黑褐色，3—4脉端部有一黑色近圆形斑，其周围白色；腹部灰色。雄蛾钩形突粗，抱器瓣的抱器腹向腹侧延伸成长突，抱钩长，阳茎短，无角状器（图671）。

分布 内蒙古、新疆；俄罗斯。