

分布 江苏、云南；日本。

老木冬夜蛾 *Xylena vetusta* (Hubner) (图版 XXIV-25)

Noctua vetusta Hubner, 1813, Samml. Eur. Schmett. 4: pl. 97, fig. 459. (欧洲)

Xylina vetusta: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 281.

Calocampa vetusta: Kostrowicki, 1956, Pol. ent. Soc. 27: 49.

Xylena vetusta: Forster et Wohlfahrt, 1971, Schmett. Mitteleur. p.195. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 314.

翅展 55mm。头与颈板灰赭色；胸部黑灰色；前翅红褐色，基部及亚端区较灰，前缘区较黑，内线双线黑色锯齿形，剑纹窄长，环纹中有二黑点，肾纹中有黑环及黑斑，外线黑色锯齿形，与肾纹间呈黑褐色，亚端线白色锯齿形，中段内侧有二黑尖纹；后翅与腹部褐色。

寄主 飞廉、麦瓶草、芒柄花等属。

分布 新疆；土耳其，欧洲。

卓夜蛾属 *Dryobotodes* Warren

Dryobotodes Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 133.

Type-species: *Noctua protea* Denis et Schiffermüller

Dichoniopsis Berio, 1980, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giac. Dor. 83: 13, 18.

Dichonioxa Berio, 1980, Boll. Soc. ent. Ital. 112: 40.

喙发达，下唇须斜向上伸，前缘饰毛，雄蛾触角微锯齿状，复眼大，圆形；头部与胸部被毛和鳞片，前后胸有散开形毛簇；腹基几节有毛簇，侧部饰毛；前翅外缘波曲，有一副室。

单色卓夜蛾 *Dryobotodes monochroma* (Esper) (图版 XXIV-26)

Phalaena Noctua monochroma Esper, 1790, Schmett., Noct. 76: 521, pl. 155, figs. 3—6. (意大利)

Noctua distans Hübner, [1813], Eur. Schmett., Noct. pl. 112, figs. 522—523.

Noctua suberis Duponchel, 1827, Lep. Fr. 7: 72.

Eumichtis monochroma: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 337. ——Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 134. ——Kostrowicki 1956, Pol. ent. Soc. 27: 58. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 315.

翅展 30mm。头、胸及前翅灰褐色，胸部及前翅杂有少许黑棕色，亚中褶基部一黑纹，基线、内线及外线均双线黑色，内、外线波浪形，剑纹大，外侧一浅褐斑，环纹、

肾纹浅褐黄色，中线黑色波浪形，亚端线灰白色，端区各翅脉黑色，脉间有黑纹；后翅浅褐色；腹部褐灰色。

寄主 栎属。

分布 黑龙江；欧洲。

剑冬夜蛾属 *Daseuplexia* Hampson

Daseuplexia Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 303.

Type-species: *Luperina lagenifera* Moore

喙发达，下唇须向上伸，第二节前缘饰长毛，第三节向前伸，额平滑无突起，有鳞簇，眼大，圆形；胸部主要被鳞，前胸有分裂的毛簇，后胸有散开型毛簇；腹部基部几节背面有毛簇；前翅有副室。

种 检 索 表

雄蛾触角双栉形 中褐剑冬夜蛾 *Daseuplexia lageniformis*
雄蛾触角锯齿形 引剑冬夜蛾 *D. lagenifera*

引剑冬夜蛾 *Daseuplexia lagenifera* (Moore) (图版 XXIV-27)

Luperina lagenifera Moore, 1882, Lep. Atk. p. 114. (大吉岭)

Euplexia lagenifera: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 304. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 110.

翅展 36mm。头部红褐色；胸部灰色，颈板红褐色；前翅赭灰色，中区带赤褐色，基线、内线及外线均双线黑褐色，双线间灰色，内线波浪形，环纹、肾纹黄白色，两纹后端相遇，中线黑褐色波浪形，亚端线灰白色，前端内侧一黑斑；后翅红褐色带黑棕色；腹部赤褐色。

分布 云南；锡金。

中褐剑冬夜蛾 *Daseuplexia lageniformis* (Hampson) (图版 XXIV-28)

Euplexia lageniformis Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 223. (锡金)

Daseuplexia lageniformis: Hampson, 1906, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 6: 303. —Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 107.

翅展 38mm。头、胸及前翅红褐色，前翅基线、内线及外线均双线黑色，双线间黄白色，外线锯齿形，剑纹粗短，黑褐色，环纹、肾纹黄白色，中线黑色波浪形，亚端线黄白色，两侧衬黑褐色；后翅黄褐色，外线可见暗褐色；腹部暗褐色。

分布 四川、西藏；锡金。