

线、亚端线内侧均衬褐黄色；后翅黑灰色；腹部暗灰色。雄蛾抱器瓣长，背缘微波曲，抱钩长，折曲，端部伸出瓣腹缘（图 537）。

**寄主** 杨、柳。

**分布** 黑龙江、新疆、河南；日本，欧洲。

## 迪夜蛾属 *Dyrzela* Walker

*Dyrzela* Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 15: 1758.

Type-species: *Dyrzela plagiata* Walker.

*Maxilua* Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc., zool. 7: 168.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，细长，第三节长，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角呈锯齿形，下缘有纤毛丛；胸部主要被鳞片，无毛簇，足胫节有长毛；前翅有一副室；后翅 5 脉弱，自中室横脉中部发出。雄蛾抱器瓣多窄长，抱钩短小。

### 种 检 索 表

1. 前翅亚顶斑近半圆形…………… 迪夜蛾 *Dyrzela plagiata*  
前翅亚顶斑非半圆形…………… 2
2. 亚顶斑完整…………… 大班迪夜蛾 *D. tumidimacula*  
亚顶斑前半色浅，后半黑色…………… 甲线迪夜蛾 *D. squamata*

### 迪夜蛾 *Dyrzela plagiata* Walker (图版 XXXVI-15)

*Dyrzela plagiata* Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 15: 1758. (印度)

*Elydna plagiata*: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 159. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 272.

*Dyrzela plagiata*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 177. —Barlow, 1982, Moths S. E. Asia p. 87.

翅展 27 mm。头与颈板乳白色带紫色；胸部与前翅灰褐带紫色，前翅前缘区中、外线间有一深褐色大班，基后缘衬以白色，中室基部有一黑点，基线只在前缘脉上现一黑点及中室上一小黑点，内线双线深褐色，波浪形，中线模糊，暗褐色，外斜，外线深褐色，锯齿形，在 1、2、3 脉上各一黑点，亚端线微白，波浪形，端线为一列黑点，前缘脉内半段黄色；后翅褐色；腹部灰褐色。

**寄主** 扁担杆属。

**分布** 广东、海南；印度，缅甸，斯里兰卡。

### 大班迪夜蛾 *Dyrzela tumidimacula* Warren (图版 XXXVI-16)

*Dyrzela tumidimacula* Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 176, pl. 20a. (马来西亚)