

Dyrzela tumidimacula: Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 14. —Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 183.

翅展 31 mm。头部黄褐色，触角基节前缘黄白色，额下半部微白，下唇须第一、二节外侧黑色，第三节灰杂褐色；胸部背面褐色，颈板基部黄灰色，足外侧黑褐色；前翅红褐色，基线隐约可见，暗褐色，自前缘脉至亚中褶，有间断，内线不明显，黑褐色，微曲外斜，环纹不显，中线细，黑褐色，近呈直线内斜，肾纹只现微弱黑边，椭圆形，外线细弱，黑褐色，自前缘脉外斜至 6 脉，微曲内斜至亚中褶，折向外斜，亚端线不显，隐约可见零星黑点，外线前段外方有一大黑斑，约呈斗形，其后缘弧形，内、外侧衬以浅黄色纹，近翅外缘有一列黑点，其内侧均衬以黄白色，缘毛赤褐色，端部深棕色；后翅黑褐色，缘毛赭黄色；腹部灰褐色，背面各节间浅黄色。

分布 云南；马来西亚，印度尼西亚等。

甲线迪夜蛾 *Dyrzela squamata* Warren (图版 XXXVI-17)

Dyrzela squamata Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World, 11: 177, pl. 20b. (缅甸)

Elydna squamata: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 273.

翅展 28 mm。头部暗褐色，下唇须前缘黄白色；胸部背面暗褐色，下胸黄白色，足跗节外侧暗褐色，各节间有白斑；前翅褐色，基线黑褐色，自前缘脉至中室后缘，两侧有黄白色细点，内线黑褐色，细波浪形，自前缘脉外斜至中室后缘，其后渐弱，线两侧密布黄白色细点，肾纹圆形，黄色黑边，外线黑褐色，细波浪形，自前缘脉外斜至 5 脉，其后渐弱，线两侧布有黄白色细点，亚端线黄白色，中段间断为点列，内侧有一列黑点，4—6 脉间为一斜方形黑斑；后翅淡褐色，外半部色较暗；腹部背面褐色。

分布 云南（勐仑）；缅甸。

齐夜蛾属 *Allocosmia* Sugi

Allocosmia Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 776.

Type-species: *Dyrzela coreana* Matsumura.

喙发达，下唇须向上伸，复眼大，触角线形，胸部被鳞为主，胫节饰长毛，前翅有一副室，后翅 5 脉细弱。

沪齐夜蛾 *Allocosmia hoenei* (Bang-Haas) (图版 XXXVI-18)

Ipimorpha [sic] (*Plastenis*) *coreana* ssp. *hoenei* Bang-Haas, 1927, Hor. Macrolepid. p. 87, pl. 10, fig. 37. (上海)

Elydna coreana hoenei: Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 189.

翅展 35 mm 左右。头部及胸部淡黄灰色，下唇须第二节外侧有黑纹，前足胫节及