

线、亚端线内侧均衬褐黄色；后翅黑灰色；腹部暗灰色。雄蛾抱器瓣长，背缘微波曲，抱钩长，折曲，端部伸出瓣腹缘（图 537）。

寄主 杨、柳。

分布 黑龙江、新疆、河南；日本，欧洲。

迪夜蛾属 *Dyrzela* Walker

Dyrzela Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 15: 1758.

Type-species: *Dyrzela plagiata* Walker.

Maxilua Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc., zool. 7: 168.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，细长，第三节长，额光滑无突起，复眼大，雄蛾触角呈锯齿形，下缘有纤毛丛；胸部主要被鳞片，无毛簇，足胫节有长毛；前翅有一副室；后翅 5 脉弱，自中室横脉中部发出。雄蛾抱器瓣多窄长，抱钩短小。

种 检 索 表

1. 前翅亚顶斑近半圆形…………… 迪夜蛾 *Dyrzela plagiata*
前翅亚顶斑非半圆形…………… 2
2. 亚顶斑完整…………… 大班迪夜蛾 *D. tumidimacula*
亚顶斑前半色浅，后半黑色…………… 甲线迪夜蛾 *D. squamata*

迪夜蛾 *Dyrzela plagiata* Walker (图版 XXXVI-15)

Dyrzela plagiata Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 15: 1758. (印度)

Elydna plagiata: Hampson, 1910, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 9: 159. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 272.

Dyrzela plagiata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 177. —Barlow, 1982, Moths S. E. Asia p. 87.

翅展 27 mm。头与颈板乳白色带紫色；胸部与前翅灰褐带紫色，前翅前缘区中、外线间有一深褐色大班，基后缘衬以白色，中室基部有一黑点，基线只在前缘脉上现一黑点及中室上一小黑点，内线双线深褐色，波浪形，中线模糊，暗褐色，外斜，外线深褐色，锯齿形，在 1、2、3 脉上各一黑点，亚端线微白，波浪形，端线为一列黑点，前缘脉内半段黄色；后翅褐色；腹部灰褐色。

寄主 扁担杆属。

分布 广东、海南；印度，缅甸，斯里兰卡。

大班迪夜蛾 *Dyrzela tumidimacula* Warren (图版 XXXVI-16)

Dyrzela tumidimacula Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 11: 176, pl. 20a. (马来西亚)

Dyrzela tumidimacula: Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 14. —Holloway, 1989, Malay. Nat. J. 42: 183.

翅展 31 mm。头部黄褐色，触角基节前缘黄白色，额下半部微白，下唇须第一、二节外侧黑色，第三节灰杂褐色；胸部背面褐色，颈板基部黄灰色，足外侧黑褐色；前翅红褐色，基线隐约可见，暗褐色，自前缘脉至亚中褶，有间断，内线不明显，黑褐色，微曲外斜，环纹不显，中线细，黑褐色，近呈直线内斜，肾纹只现微弱黑边，椭圆形，外线细弱，黑褐色，自前缘脉外斜至 6 脉，微曲内斜至亚中褶，折向外斜，亚端线不显，隐约可见零星黑点，外线前段外方有一大黑斑，约呈斗形，其后缘弧形，内、外侧衬以浅黄色纹，近翅外缘有一列黑点，其内侧均衬以黄白色，缘毛赤褐色，端部深棕色；后翅黑褐色，缘毛赭黄色；腹部灰褐色，背面各节间浅黄色。

分布 云南；马来西亚，印度尼西亚等。

甲线迪夜蛾 *Dyrzela squamata* Warren (图版 XXXVI-17)

Dyrzela squamata Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World, 11: 177, pl. 20b. (缅甸)

Elydna squamata: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 273.

翅展 28 mm。头部暗褐色，下唇须前缘黄白色；胸部背面暗褐色，下胸黄白色，足跗节外侧暗褐色，各节间有白斑；前翅褐色，基线黑褐色，自前缘脉至中室后缘，两侧有黄白色细点，内线黑褐色，细波浪形，自前缘脉外斜至中室后缘，其后渐弱，线两侧密布黄白色细点，肾纹圆形，黄色黑边，外线黑褐色，细波浪形，自前缘脉外斜至 5 脉，其后渐弱，线两侧布有黄白色细点，亚端线黄白色，中段间断为点列，内侧有一列黑点，4—6 脉间为一斜方形黑斑；后翅淡褐色，外半部色较暗；腹部背面褐色。

分布 云南（勐仑）；缅甸。

齐夜蛾属 *Allocosmia* Sugi

Allocosmia Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 776.

Type-species: *Dyrzela coreana* Matsumura.

喙发达，下唇须向上伸，复眼大，触角线形，胸部被鳞为主，胫节饰长毛，前翅有一副室，后翅 5 脉细弱。

沪齐夜蛾 *Allocosmia hoenei* (Bang-Haas) (图版 XXXVI-18)

Ipimorpha [sic] (*Plastenis*) *coreana* ssp. *hoenei* Bang-Haas, 1927, Hor. Macrolepid. p. 87, pl. 10, fig. 37. (上海)

Elydna coreana hoenei: Draudt, 1934, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 189.

翅展 35 mm 左右。头部及胸部淡黄灰色，下唇须第二节外侧有黑纹，前足胫节及