

**寄主** 柚、葎草。

**分布** 广东、广西、海南；印度，缅甸，斯里兰卡，印度尼西亚，新加坡。

**紫巾夜蛾 *Dysgonia simillima* (Guenée) (图版LIV-12)**

*Ophiusa simillima* Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 266. (爪哇; Bengal)

*Dysgonia simillima*: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 178.

*Ophiusa simillima*: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 500.

*Parallelia simillima*: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 607. ——Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 488, pl. 54e. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 356.

翅展 40 mm。头部与胸部暗褐色，翅基片中部有白色斜纹，下胸与足灰褐色；前翅灰褐色，内线内方及中、外线间色暗，基线黑色，外侧衬白色，自前缘脉后外凸，其后波曲达亚中褶，内线黑色波曲，在前缘脉处粗，前段内侧灰白色，外斜至 1 脉后稍内弯，后半内侧黑褐色，中线黑色，自前缘脉外斜至中室折向内斜，波浪形，外线黑色双线，线间灰白色，外侧衬淡褐色，自前缘脉外斜至 6 脉，成一外凸角，其后内弯，在 3—5 脉间及 1 脉处外弯，外区前缘脉带褶色，有一列灰白点，亚端线隐约可见，暗褐色，锯齿形，内侧衬灰白色，在 7 脉处外凸，线外侧各翅脉上有细白纹，前段内侧有一钩形黑斑，顶角有一小黑斑，亚中褶端部有一黑点，缘毛基部有一黄白线；后翅褐色，外线与亚端线暗褐色，细波浪形，前半不显，端线黑色，亚中褶端部有一黑纹，缘毛灰褐色，顶角后的外缘毛有一灰白斑，腹部暗褐色，背毛簇灰黑色，端部灰色。

**分布** 台湾、广东、广西；印度，斯里兰卡，越南，印度尼西亚，菲律宾。

**玫瑰巾夜蛾 *Dysgonia arctotaenia* (Guenée) (图版LIV-13)**

*Ophiusa arctotaenia* Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins. Noct. 3: 272. (Bengal)

*Parallelia arctotaenia*: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 594. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 356.

翅展 43—46 mm。全体暗灰褐色，前翅中带窄，白色，布细褐点，外线前半白色外斜，后半内斜，黑棕色，后端中带相遇，顶角一黑双齿斑；后翅中带白色椎形，外缘后半白色。幼虫绿褐色有赭褐细点，第一腹节背面有一对黄白斑，第八腹节背面有一对小黑斑。雄蛾左右抱器瓣异形，右瓣端尖，腹缘中凹，左瓣短，阳茎短小，无角状器(图 624)。

**寄主** 玫瑰。

**分布** 河北、江苏、浙江、湖北、台湾、福建、江西、广东、广西、四川、贵州、云南；日本，朝鲜，印度，缅甸，斯里兰卡，孟加拉国，斐济。




图 624 玫瑰巾夜蛾 *Dysgonia arctotaenia* (Guenée) ♂ 外生殖器

### 小折巾夜蛾 *Dysgonia obscura* (Bremer et Grey) (图版LIV-14)

*Ophiusa obscura* Bremer et Grey, 1853, Et. Ent. 1: 66. (北京)

*Leucanitis hedemanni* Staudinger, 1888, Stett. ent. Zeit. p. 267.

*Naxia coreana* Leech, 1889, Proc. zool. Soc. p. 560.

*Ophiusa obacura*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 330, pl. 61g

*Parallelia obacura*: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 610. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 153. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 357.

翅展 23 mm。头部与胸部暗灰褐色，下唇须、下胸及足色较浅；前翅内线内方暗褐色，基部微带灰色，基线褐色，自前缘脉至亚中褶，内线暗褐色，自前缘脉外斜至 2 脉后折向内斜，中线前半外弯，后半内弯，与内线之间呈褐灰色，肾纹隐约可见椭圆形，暗褐色，外线褐黑色，自前缘脉外斜至 6 脉，折角内弯，在 2—5 脉间外弯，在亚中褶处内凸，6 脉之前外侧衬白色，中线与外线之间暗褐色，亚端线不清晰，褐色波浪形，自 6 脉至翅后缘，顶角至外线折角处有一内斜二裂形黑褐斑，外线外方区域色较灰褐色，端线褐色，波浪形，各翅脉间有褐色细点；后翅暗褐色，中线与外线隐约可见，缘毛大半灰褐色；腹部暗灰褐色。

**分布** 黑龙江、河北、山东、江苏；朝鲜。

### 小直巾夜蛾 *Dysgonia dulcis* (Butler) (图版LIV-15)

*Ophiusa dulcis* Butler, 1878, Ann. Mag. nat. Hist. 5, 1: 293. (日本横滨)

*Ophiusa dulcis*: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 330, pl. 61c.

*Parallelia dulcis*: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 611. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 357. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 848. —Chen, 1992, in