

中线相遇，顶角一双齿形黑纹达外线折角处，亚端线不明显，暗褐色锯齿形；后翅暗灰褐色，中部一灰条纹，近臀角有一灰纹；腹部暗灰褐色。

分布 浙江、台湾、福建、海南；日本，朝鲜，印度，斯里兰卡，印度尼西亚等。

失巾夜蛾 *Dysgonia illibata* (Fabricius) (图版LIV-9)

Noctua illibata Fabricius, 1775, Syst. Ent. p. 592. (印度)

Parallelia illibata: Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 482. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 355.

Pindara illibata: Holloway, 1976, Moths Borneo p. 30. ——Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 100.

翅展 58 mm。头部红棕色，下唇须黄褐色；胸部背面棕色，下胸与足灰褐色；前翅棕色带紫色，有金属光泽，布有蓝灰色细点，基线棕色，两侧淡褐色，自前缘脉至 1 脉，内线棕色，较直外斜，两侧淡褐色，环纹只现一白点，肾纹灰褐色，中有棕色曲纹，中线黑棕色，波浪形，在 4 脉后内弯，外线红棕色锯齿形，前半外侧衬白色，后外外侧衬红褐色，亚端线红褐色锯齿形，顶角一近半圆形大黑斑，后缘衬白色，端区紫灰色；后翅棕色，中部一粉蓝线，端区灰白带紫色，翅脉间有一白点；腹部暗棕色杂蓝灰色。

分布 湖北、广东、海南、广西、云南；印度，缅甸，斯里兰卡，新加坡。

灰巾夜蛾 *Dysgonia umbrosa* (Walker) (图版LIV-10)

Ophiusa umbrosa Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 33: 968. (上海)

Ophiusa obumbrata Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. p. 969.

Ophiusa umbrosa: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 502.

Naxia umbrosa: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 331, pl. 61d.

Parallelia umbrosa: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 565, pl. 219, fig. 17. ——Holloway, 1976, Moths Borneo p. 30, fig. 187 male genitalia. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 355.

翅展 31—33 mm。头部与颈板棕色，胸部背面紫灰褐色；前翅紫灰色带褐色，有金属光泽，布有褐色细点，基线褐色，自前缘脉至亚中褶，内线暗褐色，波浪形，外侧有一暗褐带，肾纹为一暗褐色窄条，中线暗褐色，波浪形，自前缘脉外斜至中室折向内斜，内线与中线之间明显紫灰色，外线黑棕色，自前缘脉外斜至 6 脉，折角向后，在 3 脉后稍内弯，外区前缘脉上有 3 个白点，亚端线灰白色，自前缘脉外斜至 7 脉折角内弯，在 2—5 脉间不明显，外线与亚端线间在 6 脉前有一紫灰色半圆形区，近翅外缘有一列暗褐点，缘毛紫灰色；后翅暗棕色，外线与亚端线紫灰色，端区紫灰色；腹部紫灰褐色。雄蛾抱钩粗壮分支，基腹弧与背兜各有突起 (图 622)。