

色。

分布 广东；印度，斯里兰卡，印度尼西亚等。

霉巾夜蛾 *Dysgonia maturata* (Walker) (图版LIV-7)

Ophisma maturata Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1382. (马来西亚槟榔屿)

Ophiusa falcata Moore, 1882, Lep. Atk. p. 171.

Parallelia maturata: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal, Br. Mus. 12: 576. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 355.

翅展 52—58 mm。头、颈板紫棕色；前翅紫灰色，内线内方带暗褐色，内线直线外斜，中线直，外线黑棕色，在 6 脉成外突齿，其后内斜，亚端线灰白色锯齿形，在翅脉上为白点，顶角一棕黑斜纹；后翅暗褐色；端区带紫灰色；腹部暗灰褐色。雄蛾钩形突二支，抱器瓣背侧有一粗长突，近端部一齿突。阴茎端部近腹缘有齿突（图 621）。




图 621 霉巾夜蛾 *Dysgonia maturata* (Walker) ♂ 外生殖器

分布 山东、河南、江苏、浙江、台湾、福建、江西、海南、四川、贵州、云南；日本，朝鲜，印度，马来西亚。

弓巾夜蛾 *Dysgonia arcuata* (Moore) (图版LIV-8)

Ophiusa arcuata Moore, 1877, Proc. zool. Soc. Lond. p. 609. (安达曼群岛)

Parallelia arcuata: Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 486. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 355. ——Sugi, 1982, in Inoue *et al.*, Moths Jap. 1: 847. ——Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 100.

翅展 45 mm。头、胸暗褐色；前翅内线内方深棕带紫色，内线、中线间灰褐色，中线、外线间黑棕色，其余紫灰褐色，外线在 6 脉折角成一尖齿，后半稍内弯，后端与