

侧衬白色，自前缘脉外斜至6脉，折成一外凸齿，其后内斜，在3、4脉处外弯，在亚中褶处外凸，外线与白色带之间黑棕色，外线外方灰褐色，前缘脉上有2白点，亚端线白色，锯齿形，外侧衬黑棕色，自6脉内斜至臀角，顶角有二齿形黑棕斑，其后端达6脉，端线暗褐色，内侧有一列黑点，缘毛基部有一白线；后翅黑棕色，端区色较深，翅中部有一白带，较窄曲，亚端线仅后半可见白色，端区微白，除臀角外均带有褐色，端线黑褐色，波浪形，缘毛白色；腹部黑棕色，雄蛾臀毛簇灰白色。

分布 广东；大洋洲。

石榴巾夜蛾 *Dysgonia stuposa* (Fabricius) (图版LIV-1)

Noctua stuposa Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3 (2): 42. (India Orientali)

Ophiusa stuposa: Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 487.

Parallelia stuposa: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 588. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 356.

翅展43—46 mm。头、胸褐色；前翅内线内弯，内方黑棕色，中线直，与内线间灰白色，布褐色细点，肾纹为棕色长点，外线在6脉折角，与中线间黑棕色，外线外侧衬白色，亚端线不明显，与外线间褐色，与端线间褐灰色，其间翅脉灰白色，顶角有二齿形黑棕斑；后翅暗棕色，端区褐灰色，有一白色中带；腹部灰褐色。

寄主 石榴。

分布 河北、山东、江苏、浙江、湖北、台湾、福建、江西、广东、海南、四川、云南；日本，朝鲜，印度，斯里兰卡，菲律宾，印度尼西亚。

肾巾夜蛾 *Dysgonia praetermissa* (Warren) (图版LIV-2)

Ophiusa praetermissa Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World, 3: 329, pl. 61c, 63c. (印度；台湾)

Parallelia praetermissa: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 153. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 357. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p.1016. —Chen, 1993, in Huang, Anim. Longqi Mt. p. 542.

翅展58 mm左右。头部及胸部褐色；前翅褐色，中部有一白色外斜宽带，中室端部一黑点，外线褐色，外斜至7脉，折角微曲内斜，后端与中带接近，外线外方翅色淡，顶角至外线折角处有一暗褐斜纹；后翅暗褐色，中部有一前宽后窄的楔形白带，近臀角有一白纹及一黑斑，端区色淡。

分布 浙江、湖南、台湾、福建、江西、云南；印度。

无肾巾夜蛾 *Dysgonia crameri* Moore (图版LIV-3)

Dysgonia crameri Moore, [1885] 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 177, pl. 171, fig. 2. (印度)