

- 前翅内线微外弯 小折巾夜蛾 *D. obscura*
13. 前翅近顶角有灰斑 灰巾夜蛾 *D. umbrosa*
- 前翅近顶角无灰斑 14
14. 前翅中、外线间黑褐色 16
- 非如此 故巾夜蛾 *D. absentimacula*
15. 前翅顶角有黑褐斑 失巾夜蛾 *D. illibata*
- 前翅顶角无黑褐斑 柚巾夜蛾 *D. palumba*
16. 前翅中线直 小直巾夜蛾 *D. dulcis*
- 前翅中线弧形 弓巾夜蛾 *D. arcuata*

月牙巾夜蛾 *Dysgonia analis* (Guenée) (图版LIII-16)

Ophiusa analis Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 271. (爪哇)

Ophiusa analis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 501. — Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 329. pl. 61b.

Parallelia analis: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 586, pl. 221, fig. 1. — Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 487. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 356.

翅展 39 mm。头部与胸部棕色，下胸杂有少许白色；前翅棕色，基线隐约可见褐色，自前缘脉至亚中褶，翅中部有一白色带，前宽后窄，自前缘内中区外斜至后缘中部，中央密布棕褐色细点，外线自前缘脉外斜至 4 脉，呈白色，较粗，在 6 脉后折向内斜，呈暗棕色，至 3 脉后稍内弯，后端与中带相遇，中线与外线之间色浓褐，外区前缘脉上有 2 白点，亚端线仅在前缘区可见一白纹，顶角内半黑褐色，翅外缘布有白色细点，缘毛灰白色；后翅棕色，中部有一白色带，较窄长，微曲，臀角有一白纹，亚中褶端部有一小黑斑，翅外缘中段有一列细白点，缘毛白色杂褐色；腹部灰棕色，腹面杂有白色。

分布 广东、云南；印度，斯里兰卡，缅甸，印度尼西亚。

耆巾夜蛾 *Dysgonia senex* (Walker) (图版LIII-17)

Ophiusa senex Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1832. (澳大利亚)

Ophiusa acutissima Bethune-Baker, 1906, Nov. zool. 13: 257.

Parallelia senex: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 587, pl. 221, fig. 2. — Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 487, pl. 54b. — Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 356.

翅展 37 mm。头部与颈板褐色带赤褐色，胸部背面黑棕色；前翅内线内方黑棕色，基线褐色，自前缘脉至亚中褶，内线黑色，外侧衬白色，波浪形外斜，在中室后较显外弯，线外侧有一白色带，前宽后窄，布有黑棕细点，其外缘界限模糊，外线黑褐色，外

侧衬白色，自前缘脉外斜至6脉，折成一外凸齿，其后内斜，在3、4脉处外弯，在亚中褶处外凸，外线与白色带之间黑棕色，外线外方灰褐色，前缘脉上有2白点，亚端线白色，锯齿形，外侧衬黑棕色，自6脉内斜至臀角，顶角有二齿形黑棕斑，其后端达6脉，端线暗褐色，内侧有一列黑点，缘毛基部有一白线；后翅黑棕色，端区色较深，翅中部有一白带，较窄曲，亚端线仅后半可见白色，端区微白，除臀角外均带有褐色，端线黑褐色，波浪形，缘毛白色；腹部黑棕色，雄蛾臀毛簇灰白色。

分布 广东；大洋洲。

石榴巾夜蛾 *Dysgonia stuposa* (Fabricius) (图版LIV-1)

Noctua stuposa Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3 (2): 42. (India Orientali)

Ophiusa stuposa: Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 487.

Parallelia stuposa: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 588. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 356.

翅展43—46 mm。头、胸褐色；前翅内线内弯，内方黑棕色，中线直，与内线间灰白色，布褐色细点，肾纹为棕色长点，外线在6脉折角，与中线间黑棕色，外线外侧衬白色，亚端线不明显，与外线间褐色，与端线间褐灰色，其间翅脉灰白色，顶角有二齿形黑棕斑；后翅暗棕色，端区褐灰色，有一白色中带；腹部灰褐色。

寄主 石榴。

分布 河北、山东、江苏、浙江、湖北、台湾、福建、江西、广东、海南、四川、云南；日本，朝鲜，印度，斯里兰卡，菲律宾，印度尼西亚。

肾巾夜蛾 *Dysgonia praetermissa* (Warren) (图版LIV-2)

Ophiusa praetermissa Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World, 3: 329, pl. 61c, 63c. (印度；台湾)

Parallelia praetermissa: Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 153. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 357. ——Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1016. ——Chen, 1993, in Huang, Anim. Longqi Mt. p. 542.

翅展58 mm左右。头部及胸部褐色；前翅褐色，中部有一白色外斜宽带，中室端部一黑点，外线褐色，外斜至7脉，折角微曲内斜，后端与中带接近，外线外方翅色淡，顶角至外线折角处有一暗褐斜纹；后翅暗褐色，中部有一前宽后窄的楔形白带，近臀角有一白纹及一黑斑，端区色淡。

分布 浙江、湖南、台湾、福建、江西、云南；印度。

无肾巾夜蛾 *Dysgonia crameri* Moore (图版LIV-3)

Dysgonia crameri Moore, [1885] 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 177, pl. 171, fig. 2. (印度)