

图 875—876 雄性外生殖器. 875. 萨哈林舒涤尺蛾 *Dysstroma citrata nyirwonis* (Matsumura); 876. 灰黄涤尺蛾 *D. ochreogriseata* Heydemann

前涤尺蛾 *Dysstroma korbi* Heydemann, 1929 (图版 XIX: 27)

Dysstroma korbi Heydemann, 1929, Mitt. münchen ent. Ges. 19: 279, pl. 6: 22; pl. 8: 22; pl. 9: 53; pl. 13: 53, 54; pl. 14: 53a, 54a. (俄罗斯: 阿穆尔地区)

Cidaria (Dysstroma) korbi: Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 122, pl. 11: h.

前翅长: ♀ 17 mm。头和胸腹部背面灰褐色, 下唇须黑褐色, 基部掺杂大量白毛。胸部背面立毛簇端部黑色。前翅顶角略尖; 翅基部散布黑褐色, 亚基线模糊不清; 中带内侧桔黄色或黄褐色; 中带宽阔, 大部灰白色至浅灰色, 略带灰黄色调, 中线外侧近前缘处和外线内侧由前缘至 M_3 下方黑褐色; 中点黑色, 微小但十分清晰; 外线中部中度凸出, 凸出部分在 M_3 两侧的小齿约等长或下侧的略长; 外线外侧至亚缘线由黄白色至暗黄褐色; 亚缘线灰白色锯齿状, 其外侧深灰褐色至黑褐色, 顶角内侧有一三角形浅色斑; 缘线黑色点状, 缘毛深灰褐色掺杂黄色, 在翅脉端黄色。后翅淡灰褐色, 缘线和缘毛色较浅。前翅反面浅灰褐色, 外线上半段内侧深灰褐色, 外侧为一白斑, 亚缘线隐约可见。后翅反面灰白色, 散布褐鳞, 具褐色中点和灰褐色外线。

雌性外生殖器 (图 880): 表皮突中等长。骨环粗大, 长略大于宽。囊颈极短宽, 由囊颈至囊体下 $1/3$ 处均弱骨化。囊片十分细小, 囊片细小, 长度略大于囊体直径的 $1/3$, 中部有一狭小的中空区域。

检视标本: 1♀, 黑龙江一面坡, 1982. VI. 23; 1♀, 吉林长白山, 1974. VII. 2。




图 877—880 雌性外生殖器. 877. 双月涤尺蛾 *Dysstroma subapicaria* (Moore); 878. 齿纹涤尺蛾 *D. dentifera* (Warren); 879. 萨哈林舒涤尺蛾 *D. citrata nyiwonis* (Matsumura); 880. 前涤尺蛾 *D. korbi* Heydemann

分布：黑龙江、吉林；俄罗斯，日本。

灰黄涤尺蛾 *Dysstroma ochreogriseata* Heydemann, 1929 (图版 XIX: 28)

Dysstroma ochreogriseata Heydemann, 1929, Mitt. münchen ent. Ges. 19: 281, pl. 6: 107; pl. 14: 62. (四川)

Cidaria (Dysstroma) ochreogriseata: Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 122.

前翅长：♂ 17 mm。头和胸部背面黑褐色，掺杂白鳞，腹部背面色较浅。前翅斑纹模糊，中带略窄，其两侧暗红褐色，外线外侧仅在前后缘附近有狭窄白边，外线中部中度凸出，由前缘至凸角处较平直；中带两侧近边缘处黑灰色，中部灰白色散布黑鳞，中点弱小模糊，其下方近后缘处有环状纹；亚缘线几乎完全消失，但其外侧散布不均匀的黑灰色。后翅淡灰褐色，翅端部色渐深，可见微小深灰色中点。前翅反面基部至外线灰色，外线轮廓十分模糊，其外侧仅在前缘附近有少量灰白色。后翅反面颜色几乎同正面，中点较大较清晰，其外侧有两条“>”形线痕迹。

雄性外生殖器 (图 876)：背兜略狭长，钩形突与其长度相近。抱器瓣较前种狭长。阳茎略细长，角状器的骨刺中等大，刺长小于阳茎直径。

检视标本：1 ♂，四川康定六巴，3 450 m, 1982. IX. 8。

分布：四川。