

14. 前翅后缘近臀角处有一清晰黑褐色斑, 长约2—2.5 mm, 宽约1 mm; 中带内部分或大部灰白色
..... 15
前翅后缘近臀角处无上述黑褐色斑或仅色略深; 中带内灰白色至黑褐色 16
15. 前翅斑纹模糊, 中点微小或消失; ♂角状器为一束密集细刺; ♀囊片宽长比约为0.43
..... 灰涤尺蛾 *D. cinereata*
前翅斑纹极清晰, 中点清晰, 略大; ♂角状器仅为数支微刺; ♀囊片宽长比约为0.29
..... 黄涤尺蛾 *D. flavifusa*
16. 前翅中域灰白至浅灰黄色, 中点黑色清晰 前涤尺蛾 *D. korbi*
前翅中域灰白至黑褐色, 如为浅色, 则中点模糊不清 17
17. ♂角状器特别纤细 (直径0.01 mm), 长约为阳茎直径的1/2; ♀囊片宽阔, 宽长比约0.31—0.35
..... 中国茎涤尺蛾 *D. truncata sinensis*
♂角状器直径大于0.02 mm, 长度大于阳茎直径的2/3; ♀囊片宽长比小于0.25 18
18. 前翅中域黑褐色; 如不为黑褐色, 则♂阳茎特别粗壮 (宽约0.4—0.45 mm, 宽长比约0.3), 刺束宽大; ♀囊颈特别短粗 19
前翅中域灰白色至浅灰褐色; 外生殖器特征不如上述 20
19. 前翅中域黑褐色; ♂阳茎直径约0.21 mm, 宽长比约0.17—0.18, 刺束细, 刺细; ♀囊颈不特别短粗 仿涤尺蛾 *D. imitaria*
前翅中域灰白至黑褐色; ♂阳茎直径约0.4—0.5 mm, 宽长比约0.3, 刺束宽大, 刺粗壮; ♀囊颈特别短粗 舒涤尺蛾 *D. citrata*
20. 前翅反面外线轮廓非常清晰, 外侧灰白至灰黄色; ♂阳茎较细小 (长1.38 mm, 宽0.24 mm, 宽长比约0.17, 刺长0.175 mm) 带涤尺蛾 *D. proavia*
前翅反面外线轮廓模糊, 外侧仅在前缘附近带灰白色; ♂阳茎较粗大 (长1.52 mm, 宽0.32 mm, 宽长比约0.21, 刺长0.23 mm) 灰黄涤尺蛾 *D. ochreogriseata*

茎涤尺蛾 *Dysstroma truncata* (Hufnagel, 1768)

Phalaena truncata Hufnagel, 1768, Berl. Mag. 4: 602. (欧洲)

Phalaena centumnotata Schulze, 1775, Naturforscher, Halle 6: 92, pl. 4.

Geometra russata [Denis et Schiffermüller], 1775, Ankündigung syst. Werkes Schmett. Wienergegend: 113.

Hydriomena truncata: Meyrick, 1892, Trans. ent. Soc. Lond. 1892: 72.

Larentia truncata: Staudinger, 1901, in Staudinger & Rebel, Cat. Lepid. palaeart. Faunengeb. 1: 293.

Cidaria (*Dysstroma*) *truncata*: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 221, pl. 8: k.

Dysstroma truncata: Heydemann, 1929, Mitt. münchen ent. Ges. 19: 214, pl. 5: 1, 2, 2a, 6a; pl. 10: 1—6, 9—12; pl. 11: 1a—12a; pl. 12: 25—27, 45, 46; pl. 13: 49; pl. 14: 45a, 46a.

分布: 中国, 日本, 俄罗斯, 欧洲。

中国分布下述亚种。