

**埃及钻夜蛾 *Earias insulana* (Boisduval)** (图版XXXVIII-29)

*Tortrix insulana* Boisduval, 1833, Fn. Madag. p. 121, pl. 16, fig. 9. (毛里求斯)

*Earias siliquana* Herrich-Schaffer, 1851, Schmett. Eur. 2: 448.

*Earias smaragdinana* Zeller, 1852, K. Vet.-Akad. Hand L. p. 79.

*Earias anthophilana* Snellen, 1879, Tijds. v. Ent. 22: 96.

*Earias tristrigosa* Butler, 1881, Iris 10: 165.

*Earias insulana*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 502. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 211. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 321.

翅展 20—26 mm。头、胸绿色杂少许白色；前翅绿色、黄绿色或微带赭色，色彩多变异，一般无明显横纹，有些个体翅后缘中部有一斜梯形紫棕色斑，直达中室，或可见暗绿色中线、外线及亚端线；后翅白色，半透明，顶角及翅外缘微呈褐色；腹部白色，背面带褐色，基节背毛簇绿色。

**寄主** 棉、野苘麻、猪屎豆等。

**分布** 台湾、广东、云南；印度，缅甸，泰国，菲律宾，斯里兰卡，印度尼西亚，欧洲，非洲。

**玫斑钻夜蛾 *Earias roseifera* Butler** (图版XXXVIII-30)

*Earias roseifera* Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 18. (日本东京)

*Earias erubescens* Staudinger, 1887, Mem. Lep. 3: 175.

*Earias roseifera*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 506. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 296. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 424. —Draudt, 1935, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 211. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 145. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 321. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 796. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 992.

翅展 18—24 mm。头部黄绿色，触角暗褐色，有白环纹，下唇须褐色，布有白色细点；胸部背面黄绿色，下胸与足白色杂褐色；前翅黄绿色，中室端部区域红色，界限不清，大小亦有变化，翅外缘及缘毛褐色；后翅白色，微带褐色；腹部白色。

**寄主** 杜鹃花。

**分布** 黑龙江、河北、浙江、湖北、湖南、四川；日本，越南，印度。

**粉缘钻夜蛾 *Earias pudicana* Staudinger** (图版XXXVIII-31)

*Earias pudicana* Staudinger, 1887, Mem. Lep. 3: 174. (Amur; Wladiwostok)

*Earias pupillana* Staudinger, 1887, Mem. Lep. p. 176.

*Earias pudicana*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 507. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 321.

翅展 23 mm。头与颈板黄白色带青色，翅基片及胸背白色带粉红，前翅绿黄色，前缘约 2/3 白色带粉红色，外缘毛褐色；后翅白色；腹部灰白色。雄蛾钩形突二叉形，抱器瓣腹侧一长突，端部一曲突，抱钩棘形（图 563）。




图 563 粉缘钻夜蛾 *Earias pudicana* Staudinger ♂ 外生殖器

**寄主** 毛白杨、柳。

**分布** 黑龙江、辽宁、河北、山西、宁夏、河南、山东、江苏、浙江、湖北、湖南、江西；日本，朝鲜，俄罗斯，印度。

### 翠纹钻夜蛾 *Earias vittella* (Fabricius) (图版 XXXVIII - 32)

*Tinea vittella* Fabricius, 1794, Ent. Syst. 3 (2): 293. (E. Indies)

*Phalaena Noctua fabia* Stoll, (1781), Pap. exot. 4: pl. 355, fig. H. (preoccupied)

*Earias fabia*: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 507. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 321.

*Earias vittella*: Bretherton *et al.*, 1983, Br. Moths & Butterflies, 10: 316.

翅展 20—26 mm。头、颈板及翅基片白色；胸部绿色，中央一白条，下胸白色；前翅白色微黄，一翠绿纵条自基部沿中室外伸，向外渐宽，端部达翅外缘；后翅白色，外缘大部褐黄色；腹部白色，背面微带黄色。

**寄主** 棉、黄秋葵。

**分布** 湖北、湖南、江苏、浙江、台湾、江西、广东、广西、四川、贵州、云南；东南亚，印度，大洋洲。