

埃及钻夜蛾 *Earias insulana* (Boisduval) (图版XXXVIII-29)

Tortrix insulana Boisduval, 1833, Fn. Madag. p. 121, pl. 16, fig. 9. (毛里求斯)

Earias siliquana Herrich-Schaffer, 1851, Schmett. Eur. 2: 448.

Earias smaragdinana Zeller, 1852, K. Vet.-Akad. Hand L. p. 79.

Earias anthophilana Snellen, 1879, Tijds. v. Ent. 22: 96.

Earias tristrigosa Butler, 1881, Iris 10: 165.

Earias insulana: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 502. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 211. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 321.

翅展 20—26 mm。头、胸绿色杂少许白色；前翅绿色、黄绿色或微带赭色，色彩多变异，一般无明显横纹，有些个体翅后缘中部有一斜梯形紫棕色斑，直达中室，或可见暗绿色中线、外线及亚端线；后翅白色，半透明，顶角及翅外缘微呈褐色；腹部白色，背面带褐色，基节背毛簇绿色。

寄主 棉、野苘麻、猪屎豆等。

分布 台湾、广东、云南；印度，缅甸，泰国，菲律宾，斯里兰卡，印度尼西亚，欧洲，非洲。

玫斑钻夜蛾 *Earias roseifera* Butler (图版XXXVIII-30)

Earias roseifera Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 18. (日本东京)

Earias erubescens Staudinger, 1887, Mem. Lep. 3: 175.

Earias roseifera: Hampson, 1912, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 11: 506. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 296. —Gaede, 1937, in Seitz, Macrolep. World 11: 424. —Draudt, 1935, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 211. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 145. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 321. —Sugi, 1982, in Inoue, Moths Jap. 1: 796. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 992.

翅展 18—24 mm。头部黄绿色，触角暗褐色，有白环纹，下唇须褐色，布有白色细点；胸部背面黄绿色，下胸与足白色杂褐色；前翅黄绿色，中室端部区域红色，界限不清，大小亦有变化，翅外缘及缘毛褐色；后翅白色，微带褐色；腹部白色。

寄主 杜鹃花。

分布 黑龙江、河北、浙江、湖北、湖南、四川；日本，越南，印度。

粉缘钻夜蛾 *Earias pudicana* Staudinger (图版XXXVIII-31)

Earias pudicana Staudinger, 1887, Mem. Lep. 3: 174. (Amur; Wladiwostok)

Earias pupillana Staudinger, 1887, Mem. Lep. p. 176.