

检视标本：1 ♀，黑龙江亚布洛尼，1940. VII. 19；1 ♂，黑龙江岱岭凉水沟，1956. 6. 23；1 ♂，黑龙江岱岭，1956. VIII. 7；1 ♂ 2 ♀，同前，390 m，1959. VIII. 14，1962. 6. 21；1 ♀，内蒙古吉文，1985. VI. 30。

分布：黑龙江、内蒙古东部；欧洲，俄罗斯，日本。

丑折线尺蛾 *Ecliptopera acalles* (Prout, 1938) (图版 XVII: 15)

Cidaria (*Ecliptopera*) *acalles* Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 154, pl. 15: e.
(四川：灌县)

Ecliptopera acalles: Prout, 1940, ibidem 12: 304.

前翅长：♂ ♀ 13—15 mm。体型平均较前述两种略大。前翅中线中部的凸齿与慢折线尺蛾相近，但其尖端不如该种尖锐；中带（中线与外线之间）宽阔，在前缘处达 5.5—6.5 mm；外线由前缘至 Cu₂ 弯曲的深度同慢折线尺蛾，但由前缘至 M₃ 一段较直，在 M₃ 处或多或少形成一个圆钝的折角；翅端部折线弯曲较深，折角处圆弧形，在 M₁ 处的凸齿较大。后翅灰褐至深灰褐色，中点大而清晰，外线的轮廓十分清晰，其外侧色较浅，亚缘线几乎完全消失。

雄性外生殖器（图 742）：钩形突粗大。阳茎基环侧突中度膨大。囊形突延长，较首折线尺蛾略短，端部圆。抱器瓣特别短宽，端部平截。阳茎中等大，端膜具一束稀疏细刺。

雌性外生殖器（图 746）：骨环发达，长大于宽。囊体肥大，囊片近梭形，上中部最宽处接近骨环宽度，两端尖，长度约为前表皮突的 2 倍。

检视标本：27 ♂ 8 ♀，四川峨眉山，800—1 000 m，1957. IV. 22—IX. 20；1 ♂，四川灌县青城山，1 000 m，1977. V. 24；1 ♀，四川巫山梨子坪，1850 m，1883. VIII. 4。

分布：四川。

文脉折线尺蛾 *Ecliptopera dimita* (Prout, 1938)

Cidaria (*Ecliptopera*) *dimita* Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 153, pl. 15: e.
(云南：德钦)

Ecliptopera dimita: Prout, 1940, ibidem 12: 304.

Diactinia dimita: Viidalepp, 1977, Ent. Obozr. 56: 574.

分布：甘肃、青海、湖南、四川、云南、西藏；俄罗斯。

本种记载下述两个亚种。

指名亚种 subsp. *dimita* (Prout, 1938) (图版 XVII: 28)

前翅长：♂ ♀ 14—15 mm。额和头顶黄白色，中央黑褐色；额较狭窄，额毛簇发