

检视标本: 1 ♀, 黑龙江亚布洛尼, 1940. VII. 19; 1 ♂, 黑龙江岱岭凉水沟, 1956. 6. 23; 1 ♂, 黑龙江岱岭, 1956. VIII. 7; 1 ♂ 2 ♀, 同前, 390 m, 1959. VIII. 14, 1962. 6. 21; 1 ♀, 内蒙古吉文, 1985. VI. 30。

分布: 黑龙江、内蒙古东部; 欧洲, 俄罗斯, 日本。

丑折线尺蛾 *Ecliptopera acalles* (Prout, 1938) (图版 XVII: 15)

Cidaria (*Ecliptopera*) *acalles* Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 154, pl. 15: e.
(四川: 灌县)

Ecliptopera acalles: Prout, 1940, ibidem 12: 304.

前翅长: ♂ ♀ 13—15 mm。体型平均较前述两种略大。前翅中线中部的凸齿与慢折线尺蛾相近, 但其尖端不如该种尖锐; 中带(中线与外线之间)宽阔, 在前缘处达 5.5—6.5 mm; 外线由前缘至 Cu₂ 弯曲的深度同慢折线尺蛾, 但由前缘至 M₃ 一段较直, 在 M₃ 处或多或少形成一个圆钝的折角; 翅端部折线弯曲较深, 折角处圆弧形, 在 M₁ 处的凸齿较大。后翅灰褐至深灰褐色, 中点大而清晰, 外线的轮廓十分清晰, 其外侧色较浅, 亚缘线几乎完全消失。

雄性外生殖器 (图 742): 钩形突粗大。阳茎基环侧突中度膨大。囊形突延长, 较首折线尺蛾略短, 端部圆。抱器瓣特别短宽, 端部平截。阳茎中等大, 端膜具一束稀疏细刺。

雌性外生殖器 (图 746): 骨环发达, 长大于宽。囊体肥大, 囊片近梭形, 上中部最宽处接近骨环宽度, 两端尖, 长度约为前表皮突的 2 倍。

检视标本: 27 ♂ 8 ♀, 四川峨眉山, 800—1 000 m, 1957. IV. 22—IX. 20; 1 ♂, 四川灌县青城山, 1 000 m, 1977. V. 24; 1 ♀, 四川巫山梨子坪, 1850 m, 1883. VIII. 4。

分布: 四川。

文脉折线尺蛾 *Ecliptopera dimita* (Prout, 1938)

Cidaria (*Ecliptopera*) *dimita* Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 153, pl. 15: e.
(云南: 德钦)

Ecliptopera dimita: Prout, 1940, ibidem 12: 304.

Diactinia dimita: Viidalepp, 1977, Ent. Obozr. 56: 574.

分布: 甘肃、青海、湖南、四川、云南、西藏; 俄罗斯。

本种记载下述两个亚种。

指名亚种 subsp. *dimita* (Prout, 1938) (图版 XVII: 28)

前翅长: ♂ ♀ 14—15 mm。额和头顶黄白色, 中央黑褐色; 额较狭窄, 额毛簇发