

反面灰白色至灰黄色，具黑色中点，外线为三条纤细波状线，亚缘线内侧轮廓在前缘附近留下2—3个黑点。

雄性外生殖器（图769）：钩形突较短小，背兜宽阔，近三角形。阳茎基环侧突端部中等程度膨大。囊形突特别扁平。抱器瓣狭长，端部上角圆，下角近直角。阳茎短小，端膜具一大一小两束毛刺。

检视标本：1♂，西藏墨脱拿格，3 150 m，1974. VII. 22。

分布：西藏；印度，锡金，缅甸。

苔色折线尺蛾 *Ecliptopera muscicolor* (Moore, 1888)

Eustroma muscicolor Moore, 1888, in Hewitson & Moore, Descr. new Indian lepid. Insects Colln late Mr W. S. Atkinson; 276. (印度：大吉岭)

Cidaria muscicolor: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 350.

Ecliptopera muscicolor: Prout, 1940, in Seitz, Macrolepid. World 12: 307, pl. 30: g.

分布：台湾；印度，尼泊尔。

中国台湾记载下述亚种。

台湾亚种 *subsp. allobathra* Prout, 1931

Ecliptopera muscicolor allobathra Prout, 1931, Novit. zool. 37: 23. (台湾)

前翅色调与前种相似，但翅面大部暗黄褐色，仅留下数条黑色线纹；亚基线两条，内线中部内凹，与第二条亚基线接触；中线和外线各三条，三条线之间黑褐色，形成暗色波状带，外线中部外凸一尖齿；亚缘线为两条黑灰色细弱波状线，翅端部折线与前种相同。后翅深灰褐色，端半部可见三条模糊波状线，其上端未达前缘。

未见标本。

分布：台湾。

昏暗折线尺蛾 *Ecliptopera obscurata* (Moore, 1868)

Cidaria obscurata Moore, 1868, Proc. zool. Soc. Lond. 1867: 663, pl. 33: 7. (孟加拉)

Eustroma monana Swinhoe, 1893, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 12: 224.

Ecliptopera obscurata: Prout, 1940, in Seitz, Macrolepid. World 12: 307, pl. 30: i.

分布：四川、云南；印度，锡金，不丹，孟加拉国。

中国西南地区分布下述亚种。

德钦亚种 *subsp. dubernardi* Prout, 1940 (图版XVII: 29)

Ecliptopera obscurata dubernardi Prout, 1940, in Seitz, Macrolepid. World 12: 307. (云南：德钦)

前翅长：♂ 19—20 mm，♀ 21 mm。头和体背黄褐色，掺杂深褐色和少量白色。前