

反面灰白色至灰黄色，具黑色中点，外线为三条纤细波状线，亚缘线内侧轮廓在前缘附近留下2—3个黑点。

雄性外生殖器（图769）：钩形突较短小，背兜宽阔，近三角形。阳茎基环侧突端部中等程度膨大。囊形突特别扁平。抱器瓣狭长，端部上角圆，下角近直角。阳茎短小，端膜具一大一小两束毛刺。

检视标本：1♂，西藏墨脱拿格，3 150 m，1974. VII. 22。

分布：西藏；印度，锡金，缅甸。

### 苔色折线尺蛾 *Ecliptopera muscicolor* (Moore, 1888)

*Eustroma muscicolor* Moore, 1888, in Hewitson & Moore, Descr. new Indian lepid. Insects Colln late Mr W. S. Atkinson; 276. (印度：大吉岭)

*Cidaria muscicolor*: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 350.

*Ecliptopera muscicolor*: Prout, 1940, in Seitz, Macrolepid. World 12: 307, pl. 30: g.

分布：台湾；印度，尼泊尔。

中国台湾记载下述亚种。

### 台湾亚种 *subsp. allobathra* Prout, 1931

*Ecliptopera muscicolor allobathra* Prout, 1931, Novit. zool. 37: 23. (台湾)

前翅色调与前种相似，但翅面大部暗黄褐色，仅留下数条黑色线纹；亚基线两条，内线中部内凹，与第二条亚基线接触；中线和外线各三条，三条线之间黑褐色，形成暗色波状带，外线中部外凸一尖齿；亚缘线为两条黑灰色细弱波状线，翅端部折线与前种相同。后翅深灰褐色，端半部可见三条模糊波状线，其上端未达前缘。

未见标本。

分布：台湾。

### 昏暗折线尺蛾 *Ecliptopera obscurata* (Moore, 1868)

*Cidaria obscurata* Moore, 1868, Proc. zool. Soc. Lond. 1867: 663, pl. 33: 7. (孟加拉)

*Eustroma monana* Swinhoe, 1893, Ann. Mag. nat. Hist. (6) 12: 224.

*Ecliptopera obscurata*: Prout, 1940, in Seitz, Macrolepid. World 12: 307, pl. 30: i.

分布：四川、云南；印度，锡金，不丹，孟加拉国。

中国西南地区分布下述亚种。

### 德钦亚种 *subsp. dubernardi* Prout, 1940 (图版XVII: 29)

*Ecliptopera obscurata dubernardi* Prout, 1940, in Seitz, Macrolepid. World 12: 307. (云南：德钦)

前翅长：♂19—20 mm，♀21 mm。头和体背黄褐色，掺杂深褐色和少量白色。前

后翅均深褐色，带黄褐色调。前翅线纹黄白色；亚基线消失；内线在中室内深弯曲，其外侧至中线大部黄褐色；中线的凸齿位于臀褶处，齿尖钝圆并略下垂；中域宽阔；外线浅弧形，中部以下略内凸，在翅脉上向内凸出细小尖齿；外线与翅端部折线之间为不均匀的黄褐色，亚缘线锯齿状，折线“>”形，折角钝圆，其外侧宽阔。后翅外线（仅见轮廓）外侧带明显黄褐色，有时可见黄色锯齿状亚缘线。翅反面斑纹近似黑折线尺蛾，但常带灰黄色。

雄性外生殖器（图 770）：背兜较黑折线尺蛾略狭窄，阳茎基环侧突亦较该种细，囊形突几乎与该种相同。抱器瓣腹缘中部有一折角，端半部略向抱器腹方向弯曲，抱器背端半部至抱器端下角形成一个光滑的圆弧形。阳茎细长，端膜散布长短不一的毛刺。

雌性外生殖器（图 768）：骨环小，短宽。囊体中等大，带状囊片粗细较均匀，长度达前表皮突的 2.3 倍。

**检视标本：**1 ♂，四川峨眉山，800—1 000 m，1957. VI. 21；3 ♂ 1 ♀，云南屏边，1 500 m，1956. VI. 19；1 ♀，云南腾冲黑泥塘，1 930 m，1992. V. 28—30。

**分布：**四川、云南。

### 夕尺蛾属 *Sibatania* Inoue, 1944

*Sibatania* Inoue, 1944, Trans. Kansai ent. Soc. 14 (1): 66.

**模式种：***Cidaria mactata* Felder et Rogenhofer, 1875 (日本)

特征近似折线尺蛾属 *Ecliptopera* Warren。下唇须略长，约 1/3 伸出额外。额毛簇发达。翅较该属宽阔，外缘微波曲，前翅顶角尖。翅脉（图 771）：前后翅中室较短， $M_2$  居中；后翅  $Sc + R_1$  与  $R_s$  合并至近中室端部。

雄性外生殖器：钩形突刺状，较前属细长。囊形突特别发达，宽大并呈舌状延长。阳端基环、阳茎基环侧突和阳茎近似前属。抱器瓣狭长；抱器背骨化，具一发达基突和一刺状端突。

雌性外生殖器：前表皮中等长，后表皮突细长。前阴片骨化为一条狭长横带。囊导管短粗，具一发达骨环。囊体袋状，具一倒三角形和一个圆形骨化囊片。

**分布：**中国，日本。

### 阿里山夕尺蛾 *Sibatania arizana* (Wileman, 1911)

*Cidaria arizana* Wileman, 1911, Entomologist 44: 61. (台湾：阿里山)

*Ecliptopera mactata arizana*: Prout, 1940, in Seitz, Macrolepid. World 12: 303.

*Sibatania arizana*: Inoue, 1977, Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 13: 266.

**分布：**浙江、湖北、湖南、江西、福建、台湾、广西、四川、云南；日本。