

前翅中室后无黑纹 丽栖夜蛾 *E. bella*

栖夜蛾 *Egira conspicillaris* (Linnaeus) (图版XIX-32)

Phalaena Noctua conspicillaris Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10) 1: 515. (欧洲)

Xylomania conspicillaris: Hampson, 19 (5, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 398. —Warren, 1909, in Seitz, Macrolep. World 3: 88.

翅展 35 mm。头部灰色杂褐色；胸部灰色杂黑色；前翅灰色，部分带褐色，翅脉黑色，亚中褶有一黑纵纹，基、内线黑色，后者锯齿形，剑纹窄，环、肾纹大，均黑边，中线黑褐色模糊，外线双线黑色，间断为点列，亚端线白色，1—4 脉间锯齿形，线外方黑褐色；后翅白色，翅脉、顶角区褐色；腹部灰色。

分布 新疆；中亚地区，欧洲。

丽栖夜蛾 *Egira bella* (Butler) (图版XIX-33)

Xylomyges bella Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 175. (日本)

Xylomania bella: Hampson, 1905, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 5: 399. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 305.

Xylopolia bella: Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 707.

翅展 32 mm。头部灰色杂黑色；胸部灰色杂黑色并带赭色；前翅白色，密布黑褐细点，基线双线黑色波浪形，内、外线黑色，后者锯齿形，剑纹黑边，有一黑条外伸，环、肾纹大，浅赭色围白环，亚端线白色，外侧一系列黑齿纹，顶角有一斜白纹；后翅白色，端区微褐，外线为黑点列；腹部褐色。

分布 黑龙江；日本。

蒙夜蛾属 *Monostola* Alpheraky

Monostola Alpheraky, 1892, Mem. Lepid. 6: 37.

Type-species: *Monostola asiatica* Alpheraky.

喙发达，下唇须斜向上伸，第二节前缘饰毛，额平滑，眼大，圆形，雄蛾触角双栉形，栉长；头部与胸部被毛，前、后胸有散开型毛簇；腹部背面有一列毛簇；前翅有副室。

蒙夜蛾 *Monostola asiatica* Alpheraky (图版XIX-34)

Monostola asiatica Alpheraky, 1892, Mem. Lep. 6: 37, pl. 2, fig. 7. (Gan-sou)

Monostola asiatica: Warren, 1910, in Seitz, Macrolep. World 3: 88. —Chen et al., 1991, Noct. Fn. Xizang p.184.

翅展 36 mm。头、胸、腹及前翅红棕色，前翅中区色较暗，翅脉暗褐色，基线、