

- 体型较大 (前翅长 14—16 mm); 前翅中线中部凸齿齿尖不下垂; 后翅深灰褐色 台湾焰尺蛾 *E. taiwana*
10. 体型较大 (前翅长 15 mm 以上); 前翅正反面均有强烈金色光泽 金纹焰尺蛾 *E. fulgidaria*
 体型较小 (前翅长 13 mm); 前翅无金色光泽 嘉焰尺蛾 *E. aggreiens*
11. 前翅中线略呈浅弧形; 内线与中线间和外线外侧黄褐色, 灰暗 怒焰尺蛾 *E. rhacophora*
 前翅中线直且斜行; 内线与中线间和外线外侧黄色与鲜黄褐色掺杂 12
12. 前翅中线和外线的白色分别向内、外侧扩展, 黄色带退缩; ♂ 抱器瓣端部宽度小于抱器背端突宽的 1/2 阔焰尺蛾 *E. tsermosaria*
 前翅中线和外线为白色细线, 不向其内侧和外侧的黄色部分扩展; ♂ 抱器瓣端部宽度仅略窄于抱器背端突宽 疏焰尺蛾 *E. aliena*
13. 前翅内线与中线间的浅色带宽阔, 在臀褶处宽约 2 mm 乌苏里焰尺蛾 *E. corylata fabrefactaria*
 前翅内线与中线间的浅色带狭窄, 在臀褶处宽仅 1 mm 14
14. 前翅内线与中线互相融合, 深锯齿状; 外线加粗, 与亚缘线接近 ... 银纹焰尺蛾 *E. chrysophaes*
 前翅内线不与中线融合, 浅锯齿状; 外线细, 远离亚缘线 雪焰尺蛾 *E. niveonotata*

焰尺蛾 *Electrophaes corylata* (Thunberg, 1792)

Phalaena corylata Thunberg, 1792, Diss. ent. sistens Insecta Suecica (4): 61, pl., fig. [11]. (欧洲)

Larentia corylata: Staudinger, 1901, in Staudinger & Rebel, Cat. Lepid. palaeart. Faunengeb. 1: 307.

Cidaria (Euphyia) corylata: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 251, pl. 10: 1.

Electrophaes corylata: Prout, 1923, Novit. zool. 30: 197.

Cidaria (Electrophaes) corylata: Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 155.

寄主植物: 栎属、桦木属。

分布: 东北; 欧洲, 俄罗斯, 日本。

下述亚种分布在中国东北地区。

乌苏里亚种 subsp. *fabrefactaria* (Oberthür, 1881) (图版 XVIII: 1)

Cidaria fabrefactaria Oberthür, 1881, Études d'Ent. 5: 56, pl. 4: 15. (乌苏里地区)

Larentia corylata var. *fabrefactaria*: Staudinger, 1901, in Staudinger & Rebel, Cat. Lepid. palaeart. Faunengeb. 1: 307.

Cidaria (Euphyia) corylata fabrefactaria: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 251.

Cidaria (Electrophaes) corylata fabrefactaria: Prout, 1938, ibidem 4 (Suppl.): 156, pl. 15: g.

Electrophaes corylata fabrefactaria: Viidalepp, 1977, Ent. Obozr. 56: 576.

前翅长: ♂ 13—14 mm, ♀ 14—16 mm。额深褐色, 上缘黄褐色, 头顶灰褐色; 下