

图 650—654 雌性外生殖器. 650. 灰黄石尺蛾 *Entephria ravaria* (Lederer); 651. 间石尺蛾 *E. intermediaria* (Alphéraky); 652. 西藏灰石尺蛾 *E. poliotaria tibetaria* Aubert; 653. 点石尺蛾 *E. punctatissima* (Warren); 654. 静石尺蛾 *E. clementia* Inoue

静石尺蛾 *Entephria clementia* Inoue, 1982 中国新记录 (图版 XVI: 2)

Entephria clementia Inoue, 1982, Bull. Fac. domestic Sci., Otsuna Woman's Univ. 18: 153, fig. 23: B, C, fig. 24: D. (尼泊尔)

前翅长: ♂ 15—16 mm, ♀ 14—15 mm。体和前翅深灰褐至深褐色, 头和胸部背面掺杂白鳞。前翅亚基线和中带深褐至黑褐色; 亚基线弧形; 中带形状同间石尺蛾, 但较宽阔, 其两侧边缘波曲很浅, 在翅脉上有清晰的白点; 中点黑色短条状, 其周围有不规则的浅色斑点; 中带和亚缘线之间在翅脉上有另外三列白点, 亚缘线为翅脉间一列较大的白点; 缘线和缘毛在翅脉端有一微小白点, 在两翅脉间有一较大的白点。后翅灰褐色, 中点深灰色, 外线锯齿状, 较模糊; 无明显缘线, 缘毛白色, 在翅脉端有一深灰褐色点。前翅反面由基部至外线深灰褐色, 中点近于消失; 外线在前缘处形成一个黑斑, 其外侧在前缘处为黄色; 外线外侧色较浅。后翅反面颜色较浅, 中点大而清晰, 外线和亚缘线内侧的轮廓线深褐色, 弧形弯曲。后翅中室端脉双折角。

雄性外生殖器 (图 649): 钩形突粗且长, 不膨大。阳端基环中突颈部较细, 下 1/3 处迅速增粗并弯折, 整体呈倒置的足状。抱器瓣中部近抱器背处有一细长毛束, 抱器背隆起平缓, 端部圆, 其下方有一微小刺突。阳茎粗大。

雌性外生殖器 (图 654): 骨环短粗。囊体较小, 囊片形状与西藏灰石尺蛾相近,

但边缘较规则。

检视标本：1♀，四川泸定新兴，1 900 m，1983. VI. 13；1♂，西藏勒布；1♂，西藏墨脱提琴，3 400 m，1982. IX. 6；1♀，西藏吉隆托当，3 300 m，1975. VIII. 3。

分布：西藏；尼泊尔。

砾石尺蛾 *Entephria multicava* Prout, 1939

Entephria multicava Prout, 1939, in Seitz, Macrolepid. World 12: 274, pl. 27: f. (缅甸)

分布：四川、西藏；缅甸。

中国记载下述亚种。

四川亚种 *subsp. orientata* Aubert, 1959 (图版 XVI: 3)

Entephria multicava orientata Aubert, 1959, Z. wien. ent. Ges. 44: 198. (四川：打箭炉)




图 655—656 外生殖器. 655. 四川砾石尺蛾 *Entephria multicava orientata* Aubert, ♂; 656. 同前, ♀

前翅长：♂ 17 mm，♀ 18—20 mm。近似点石尺蛾 *E. punctatissima* (Warren)。颜色较浅，前翅深色斑纹和白点均不如该种鲜明；亚基线弧形，略波曲，在中室内无大凸齿；中带较窄，但下端不特别窄缩，内缘浅弧形弯曲，外缘在 M_1 以下较平直，中带内外两侧的伴线在翅脉上留下清晰的黑点；♂翅面散布模糊黄色，其中以中带内侧和 M_3 基部附近较为明显。后翅几乎与点石尺蛾相同。翅反面颜色较浅。后翅中室端脉的双折