

但边缘较规则。

检视标本：1♀，四川泸定新兴，1 900 m，1983. VI. 13；1♂，西藏勒布；1♂，西藏墨脱提琴，3 400 m，1982. IX. 6；1♀，西藏吉隆托当，3 300 m，1975. VIII. 3。

分布：西藏；尼泊尔。

砾石尺蛾 *Entephria multicava* Prout, 1939

Entephria multicava Prout, 1939, in Seitz, Macrolepid. World 12: 274, pl. 27: f. (缅甸)

分布：四川、西藏；缅甸。

中国记载下述亚种。

四川亚种 subsp. *orientata* Aubert, 1959 (图版 XVI: 3)

Entephria multicava orientata Aubert, 1959, Z. wien. ent. Ges. 44: 198. (四川：打箭炉)




图 655—656 外生殖器. 655. 四川砾石尺蛾 *Entephria multicava orientata* Aubert, ♂; 656. 同前, ♀

前翅长：♂ 17 mm，♀ 18—20 mm。近似点石尺蛾 *E. punctatissima* (Warren)。颜色较浅，前翅深色斑纹和白点均不如该种鲜明；亚基线弧形，略波曲，在中室内无大凸齿；中带较窄，但下端不特别窄缩，内缘浅弧形弯曲，外缘在 M_1 以下较平直，中带内外两侧的伴线在翅脉上留下清晰的黑点；♂翅面散布模糊黄色，其中以中带内侧和 M_3 基部附近较为明显。后翅几乎与点石尺蛾相同。翅反面颜色较浅。后翅中室端脉的双折

角较该种弱。

雄性外生殖器 (图 655): 近似静石尺蛾。阳端基环中突较该种细长, 在中部 1/2 处弯折。抱器背中部呈半圆形隆起, 端部具一短粗角状端突, 伸达抱器端。

雌性外生殖器 (图 656): 前阴片呈碗状骨化。骨环粗大。囊体腹面中部有一片弱骨化区, 无囊片。

检视标本: 2 ♂ 4 ♀, 云南中甸大雪山亚口, 4 000 m, 1981. VIII. 16—18。

分布: 四川、云南、西藏。

磊尺蛾属 *Parentephria* Yazaki, 1995

Parentephria Yazaki, 1995, in Haruta (ed.), *Tinea* 14 (Suppl. 2): 7.

模式种: *Glaucopteryx stellata* Warren, 1893 (锡金)

非常近似石尺蛾属, 外部特征几乎与该属相同。外生殖器有如下区别: ♂ 抱器背平直简单, 无突起; 抱器腹骨化并具两个褶状端突; 阳茎基环侧突延长并互相联合形成一细长突。♀ 囊导管延长并大部骨化。

分布: 四川、西藏; 尼泊尔, 锡金, 克什米尔地区。

黄星磊尺蛾 *Parentephria stellata* (Warren, 1893) (图版 XVI: 4)

Glaucopteryx stellata Warren, 1893, *Proc. zool. Soc. Lond.* 1893: 367. (锡金)

Larentia adjrouaria Oberthür, 1894, *Études d'Ent.* 18: 36, pl. 4: 59.

Larentia stellata: Hampson, 1895, *Fauna Br. India (Moths)* 3: 369.

Cidaria (Entephria) stellata: Prout, 1914, in Seitz, *Macrolepid. World* 4: 237, pl. 10: i.

Entephria stellata: Prout, 1939, *ibidem* 12: 274; Inoue, 1982, *Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ.* 18: 152, fig. 24: A.

Eulype stellata: Aubert, 1959, *Z. wien. ent. Ges.* 44: 202, pl. 22: 124.

Parentephria stellata: Yazaki, 1995, in Haruta (ed.), *Tinea* 14 (Suppl. 2): 7, figs 560, 561, 567, pl. 99: 9.

前翅长: ♂ 14—18 mm, ♀ 17—18 mm。头和体背深褐色, 掺杂少量白鳞。前翅底色暗黄褐色, 略带暗绿色调, 大部区域被暗褐色模糊斑纹覆盖; 亚基线处有一条弧形浅色带; 深色中带两侧各有一条浅色锯齿状带; 中点黑褐色; 亚缘线浅色锯齿状, 细弱模糊; 缘线黑褐色, 在翅脉端有白点, 缘毛深褐色与白色掺杂。后翅浅灰色, 具微小深色中点; 近翅端部处有一条深灰色线, 其外侧色略深; 缘线同前翅, 缘毛色较浅。翅反面灰褐至深灰褐色, 除前后翅中点外几乎无斑纹。

雄性外生殖器 (图 657): 阳茎基环侧突在背兜腹面联合并呈一支细长刺状延长至钩形突基部以上。囊形突短宽。抱器瓣较前种狭窄, 背缘平直, 抱器腹骨化, 具两个短