

*Entephria polata occata*: Viidalepp, 1977, Ent. Obozr. 56: 566.

斑纹几乎完全同间石尺蛾 *E. intermediaria* (Alphéraky), 但中室端脉仅一个折角。颜色较深, 前翅中带两侧深灰褐色, 中带边缘有明显白边。

未见标本。

分布: 新疆; 中亚地区。

### 灰石尺蛾 *Entephria poliotaria* (Hampson, 1902)

*Larentia poliotaria* Hampson, 1902, J. Bombay nat. Hist. Soc. 14: 517. (克什米尔地区)

*Cidaria* (*Entephria*) *poliotaria*: Prout, 1914, in Seitz, Macrolepid. World 4: 237, pl. 13: n.

*Entephria poliotaria*: Prout, 1939, ibidem 12: 274.

分布: 云南、西藏; 尼泊尔, 克什米尔地区, 喜马拉雅山西北部。

### 西藏亚种 subsp. *tibetaria* Aubert, 1959 (图版 XVI: 6)

*Entephria poliotaria tibetaria* Aubert, 1959, Z. wien. ent. Ges. 44: 195, pl. 20: 85—88. (西藏)




图 648—649 雄性外生殖器. 648. 点石尺蛾 *Entephria punctatissima* (Warren);  
649. 静石尺蛾 *E. clementia* Inoue

前翅长: ♂ 15—16 mm, ♀ 17 mm。下唇须深灰褐色, 第一节腹面和第三节黄白色。额、头顶和腹部背面黄白色, 胸部背面白色。前翅亚基线细带状, 上半部弧形弯曲, 中室中部以下较直并向外倾斜; 中带形状近似间石尺蛾 *E. intermediaria* (Alphéraky), 但上端较宽, 中线中部折角以下和外线  $M_1$  处折角以下均不规则波曲, 波

齿远大于该种；中点黑灰色清晰，周围色较浅，有时形成模糊白圈；部分个体中带两侧呈灰褐色，中带边缘及亚基线模糊；亚缘线为一列白点，白点内侧有时有齿状小黑点；缘线黑褐色不连续。后翅黄白色，中点灰色极弱小，几乎无其它斑纹。前翅反面浅灰色，隐见正面斑纹。后翅反面黄白色，中点较正面大而清晰。后翅中室端脉为强烈双折角。

雄性外生殖器（图 647）：钩形突粗大刺状。阳端基环中突基部较细，端半部增粗，中部膨大并略弯折。抱器瓣较间石尺蛾长，端部圆；抱器背平直，端半部无明显展宽，抱器背端突指状，远较间石尺蛾细长，向上翘起。阳茎粗大。

雌性外生殖器（图 652）：骨环细。囊体肥大。囊片细长水滴形，边缘不规则。

检视标本：1♀，云南德钦白芒雪山，3 700 m，1981. VIII. 27；1♂，西藏察隅真空桥，3 820 m，1973. VIII. 24；1♂，西藏昌都，3 900 m，1976. VIII. 9。

分布：云南、西藏；尼泊尔。

#### 点石尺蛾 *Entephria punctatissima* (Warren, 1893) 中国新记录 (图版 XVI: 1)

*Glaucopteryx punctatissima* Warren, 1893, Proc. zool. Soc. Lond. 1893: 368. (锡金)

*Larentia punctatissima*: Hampson, 1895, Fauna Br. India (Moths) 3: 369.

*Entephria punctatissima*: Prout, 1939, in Seitz, Macrolepid. World 12: 274, pl. 27: e.

前翅长：♂ 16—17 mm，♀ 18 mm。下唇须中部深褐色，周边黄白色。头和胸部背面黄白色与深褐色掺杂，腹部背面色较深，各腹节后缘有白边。前翅较宽阔，整体颜色较深，底色浅灰色，但深褐至黑褐色斑纹占据大部区域；翅基至亚基线黑褐色，亚基线在中室内向外凸出一尖齿，齿尖向上翘；内线的模糊带在前后缘形成黑斑；中带宽阔，上端宽约 5—6 mm，下端宽约 1.5—2 mm，上中部向外隆，中线和外线不规则波状或锯齿状，齿凹内有一列鲜明的白点；中带中部有时色较浅，可见微小黑色中点；外线外侧的浅色带上有一条模糊伴线；翅端部色深，亚缘线为一列粗大鲜明的白点；缘线在翅脉端两侧各有一个黑褐点，缘线白色与褐色掺杂，在翅脉端有一褐点。后翅浅灰色，中点深灰褐色；翅端部具弧形外线与亚缘线轮廓；缘线和缘毛同前翅。前翅反面外线以内深灰色，以外灰褐色，外线轮廓清晰，中点弱小或消失。后翅反面颜色略浅，中点清晰，外线为一条清晰的褐色弧形细带。后翅中室端脉为强烈双折角。

雄性外生殖器（图 648）：钩形突粗大，端半部略膨大。阳端基环中突细长棒状，端部膨大呈球状。抱器瓣狭长，宽度均匀；抱器瓣在抱器背中部腹面向上隆起，并具一浓密长毛束；抱器背端部 1/4 处略隆起，端部逐渐窄缩至短小角状端突。阳茎中等大。

雌性外生殖器（图 653）：骨环细小。囊体大，囊片蝌蚪状，下端近完整的球形。

检视标本：8♂ 1♀，西藏墨脱提琴，3 400 m，1982. IX. 6。

分布：西藏；锡金，尼泊尔。