

Seitz, Macrolep. World, 3: 322, pl. 58d. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 152. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 350.

翅展 90 mm。头部与胸部棕褐色；雄蛾前翅黑褐色，带有青紫色光泽，内半部在中室后被有香鳞，呈褐色，内线黑色，微波曲，自前缘脉至中室后缘，肾纹红褐色，后端外凸，呈二齿形，杂有少许银蓝色，黑边，中线黑色，自前缘区后半圆形外弯，绕过肾纹外侧至其后端，其后不显，线内侧衬褐色，与肾纹之间为黑色大斑，中线外方有一暗褐色外弯粗线，外线白色，自前缘区后外斜，在 5—6 脉间及 3—4 脉间明显外凸，其后波浪形稍内斜，并渐细弱；后翅黑褐色，有一狭窄紫蓝色端带，缘毛褐色；雌蛾前翅内线完整，后端达翅后缘，中线在肾纹后波浪形达后缘；后翅可见中线及白色波浪形外线；腹部棕褐色。

分布 浙江、湖北、福建、江西、四川。

眯目夜蛾属 *Entomogramma* Guenée

Entomogramma Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 203.

Type-species: *Entomogramma faultrix* Guenée

Taramina Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 153.

喙发达，下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节稍长，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角一般有纤毛及鬃毛；胸部被毛，混杂一些鳞片，无毛簇，胫节均具刺，前足胫节外侧有毛；腹部无毛簇；前翅前缘在顶角处很拱，顶角很尖，外缘曲度平稳，中部外弯，锯齿形，有副室，后翅中室约为翅长的 1/3。

种 检 索 表

雄蛾触角单栉形 梳角眯目夜蛾 *Entomogramma torsa*
雄蛾触角线形 眯目夜蛾 *E. faultrix*

眯目夜蛾 *Entomogramma faultrix* Guenée (图版II-3)

Entomogramma faultrix Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 304.
(Bengal)

Entomogramma faultrix: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 532. —Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 317, text fig. 55. —Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 321, pl. 58c. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 464. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 351.

翅展 56 mm。头部黑棕色，颈板黄褐色，胸、腹部灰褐色；前翅灰褐色，有一黑棕色纵条自中室基部至顶角，其前缘红赭色，内线黑棕色，中线、亚端线黑棕衬黄赭

色，三线均自前缘脉外斜至黑棕纵条，折角直线内斜，肾纹小，黑色，外线黑棕色波浪形，亚端线外方一波浪形黑棕色细线，端线棕色；后翅灰褐色，各横线黑棕色，内线、亚端线较直，中线波浪形，端区一系列黑点，端线黄色。

分布 福建、海南、广西、云南；印度，缅甸，孟加拉国。

梳角眯目夜蛾 *Entomogramma torsa* Guenée (图版II-6)

Entomogramma torsa Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 204.
(爪哇)

Entomogramma squamicornis Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 115. fig. 3.

Entomogramma vanua Felder et Rogenhofer, 1874, Reis. Nov. pl. 115. fig. 4.

Taramina torsa: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 153.

Entomogramma torsa: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 314, text fig. 53. —
Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 464, pl. 46e. —Chen, 1982, Icon. Het.
Sin. 3: 351.

翅展 50 mm。头部黑棕色；颈板锈褐色；胸部背面灰褐色，下胸灰白色，后足胫节与跗节外侧黑褐色；前翅灰褐色，一暗褐纵纹沿中室前缘外伸直达顶角，内线与外线黑棕色，曲度相似，均自亚前缘脉后折向内斜，外线较粗，肾纹黑色，倒逗点形，外线外方有一列黑点，但前缘区内为黑色外斜线，一棕色线自顶角内侧外斜，在暗褐纵纹后缘内伸再折向内斜，内侧衬以黄色，亚端线外另有一列外衬灰色的黑点，端线褐色；后翅灰褐色，内线暗褐色，较直内斜，外侧有一隐约暗褐线与之平行，亚端线灰黄色，两侧微褐，后端达臀角，外方有一列黑点位于各翅脉间，端线细；腹部灰褐色，腹面灰白色。

分布 福建、海南、云南；印度尼西亚。

变色夜蛾属 *Hypopyra* Guenée

Hypopyra Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 198.

Type-species: *Noctua vespertilio* Fabricius.

Enmonodia Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1332.

Maxula Walker, 1865, List Spec. Lep. Colln. Br. Mus. 33: 1096.

Pyramarista Kirby, 1896, Ann. Mag. nat. Hist. 6, 18: 391.

喙发达；下唇须向上伸，第二节达头顶，第三节长；额平滑，有毛簇，复眼圆大，胸部仅被毛，无毛簇；各足胫节外侧饰长毛，雄蛾后足胫节及跗节毛很长；腹部基节有粗毛，但无毛簇；前翅前缘端略拱，外缘曲度平稳，不成锯齿形；后翅中室约为翅长的 $1/3$ 。