

Ephesia streckeri: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 315. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 348.

翅展 53mm。头、胸黑棕杂灰白色；前翅灰白色密布黑褐细点，内线内方黑褐色，基线、内线及外线黑色，内线与外线锯齿形，肾纹新月形，前方一黑褐三角形斑，后方有白色心形斑，黑边，亚端线灰白色锯齿形，翅外缘一列衬白的黑点；后翅黄色，中带与端带黑色，前者在亚中褶折向内至翅基部，在 3、4 脉处明显外突；腹部褐灰色。

寄主 蒙古栎。

分布 黑龙江；日本，俄罗斯。

布光裳夜蛾 *Ephesia butleri* (Leech) (图版 XLVIII-11)

Catocala butleri Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 534. (中国西部: Kei-chow, Pu-tsu-fong)

Ephesia butleri: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 175, pl. 201, fig. 6. ——Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 317, pl. 56d. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 348.

翅展 75mm。头、胸黑棕杂灰色，额有白纹，颈板端部白色，翅基片有黑纹；前翅灰色，有细黑点，内线内方较黑，中区带有青色，端区带有褐色，基线、内线及外线黑色，亚中褶基部一黑纵纹，基线、内线波浪形，肾纹外缘锯齿形，前方一黑斑，后方一灰白斑，外线锯齿形，前端外侧一白斑，亚端线灰白色锯齿形，两侧黑色，端线为一列黑白相并的点；后翅金黄色，中带与端带黑色，前者中段膨大，后端在亚中褶处与后缘区大黑斑相合；腹部黑褐色。

分布 福建、四川、贵州、云南、西藏。

幻光裳夜蛾 *Ephesia inconstans* (Butler) (图版 XLVIII-12)

Catocala inconstans Butler, 1889, Ill. Het. Br. Mus. 7: 76, pl. 132, figs. 2, 3. (印度)

Ephesia inconstans: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 181. ——Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 316, pl. 56g.

翅展 66mm。头部与胸部灰色杂褐色，头部带黑色，额两侧有黑斑，下唇须基部前缘白色，颈板中部有黑横线，足跗节黑色，各节间有白斑；前翅灰色带褐色，布有细黑点，基线黑色，自前缘脉波曲外斜至亚中褶，内线双线黑色，波曲外斜，内一线弱，外一线粗，在前缘脉上成小方斑，在 1 脉处强内突，肾纹灰色黑边，中有黑圈，其外缘锯齿形，后方有一灰白斑，黑边，中有暗褐纹，外线黑色，自前缘脉后强外斜，至 6 脉后折角内斜，并呈锯齿形，在 1 脉明显内突，内侧有一黑纵纹，亚端线白色，两侧衬黑色，波浪形，自前缘脉外斜至 7 脉折角内斜，顶角有一内斜黑纹，近翅外缘有一列黑点，外侧均衬白色；后翅黄色，中部有一黑带外斜至亚中褶后折向内与亚中褶的黑纵条