

相合，带的内缘在中脉处内突，外缘在5脉处外突，端区有一黑带，其内缘在7脉处内突，缘毛在2—7脉间黑黄相间；腹部灰褐色。

分布 四川；印度，克什米尔地区。

本种与 *Catocala tapestrina* Moore 近似，Gaede (1938) 曾将其作为 *C. tapestrina* Mr. 的一宗。

美光裳夜蛾 *Ephesia formosana* (Okano) (图版 XLVIII-13)

Catocala formosana Okane, 1958, Ann. Rep. Gakugei Faculty Iwate Univ. 13 (2): 54, pl. 1, fig. 3. (台湾)

Catocala formosana: Sugi, 1982, Tyo to Ga, 32 (3, 4): 149, figs. 3, 4; 11.

翅展 70mm。头、胸褐色杂灰白色，颈板有黑横线；前翅红褐色，大部带灰色，基线与内线均双线黑色波浪形，亚中褶基部一黑纵纹，肾纹隐约可见，中线黑色，后半间断，外线黑色，在4—6脉为外突齿，其后锯齿形内斜线内方有二深棕色波浪形线，后半不显，内侧带深棕色，亚端线灰褐色波浪形，顶角一内斜黑纹，外线外方的翅脉有黑及黄灰色，翅外缘一列黑点；后翅黄色，中带与端带黑色，亚中褶一黑纵条伸达中带；腹部污褐色。

分布 台湾、广西。

黄褐光裳夜蛾 *Ephesia infasciata* Mell (图版 XLVIII-14)

Ephesia infasciata Mell, 1936, Dt. ent. Z. Iris, 50: 87, pl. 3, fig. 13. (云南丽江)

Ephesia infasciata: Draudt, 1935, in Seitz, Macrolep. World 3 Suppl. p. 266.

翅展 50mm。头部灰白色杂黑褐色，下唇须外侧大部黑色，第二节端部白色；颈板褐色杂黑褐色及灰白色；胸部背面黑褐色，下胸浅褐灰色，足外侧杂黑色，跗节黑色有白斑；前翅底色深褐，大部带有黑色，基线黑色波曲，自前缘脉至亚中褶，内线黑色，在前缘区为粗短条，其后外斜，2脉后折向内斜，1脉处成一内突齿，线内侧在中室后另有一黑线，较弱，肾纹褐色黑边，中有一黑圈，外线双线黑色，锯齿形，在中褶处外突明显，其后内斜；后翅杏黄色，无斑纹，缘毛浅黄色；腹部黑褐色，背毛簇黑色，腹面褐灰色。

分布 云南。

本种后翅无暗色带，易与其他种区别。

蛸夜蛾属 *Ulotrichopus* Wallengren

Ulotrichopus Wallengren, 1860, Wien. ent. Monatschr. 4: 174.