




图 608 鸽光裳夜蛾 *Ephesia columbina* (Leech) ♂ 外生殖器

分布 河南、湖北、浙江、四川。

珠光裳夜蛾 *Ephesia invasa* (Leech) (图版 XLVI-13)

Catocala invasa Leech, 1900, Trans. ent. Soc. Lond. p. 531. (中国: Chia-ting-fu, 湖北长阳)

Ephesia invasa: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 201, pl. 202, fig. 1. —

Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 319. —Mell, 1936, Ent. Ver. Iris Dresden, 50: 86.

翅展 60mm。头部与胸部灰色杂黑色，额两侧各有一黑纹，下唇须第二节端半部及第三节灰黑色，颈板中部有黑色横纹，前胸有褐条，下胸与足灰白色，胫节与跗节有黑条；前翅灰色，基线细，黑色，在前缘区折角，后端达亚中褶，内线黑色，微波曲外斜，1脉后外突，线内侧带黑褐色，向内渐浅，线外侧在亚中褶之前有一灰白斜带，环纹不显，肾纹有不完整的黑边，中央有一黑纹，肾纹外侧有一模糊黑斑，其外侧有几个尖齿状纹，外线黑色，自8脉强外斜，在6脉后折角，深锯齿形内斜，在3脉后回弯至肾纹后再返回，后端近达臀角，外线前段外侧有一黑褐曲纹，亚端线不明显，一黑纹自顶角后内斜至外线，6、7、8脉端部带黑色，端线黑色，波浪形；后翅黄色，亚中褶有一模糊黑纵条，中区有一黑色曲带，在4脉及亚中褶处外突，端区有一黑带，在亚中褶处中断，其后为一水滴形黑斑，带的中段外缘波浪形；后翅灰褐色。

分布 陕西、江苏、湖北、四川。

光裳夜蛾东方亚种 *Ephesia fulminea chekiangensis* Mell (图版 XLVI-14)

Ephesia fulminea ssp. *chekiangensis* Mell, 1933, Mitt. Dt. ent. Ges. E. V. 4: 64. (西天目山)