




图 724—725 雄性外生殖器. 724. 白眉洲尺蛾 *Epirrhoe brephos brephos* (Oberthür); 725. 黄眉洲尺蛾 *E. leucophoca* (Prout)

分布：甘肃、湖北、四川、云南、西藏。

备考：Inoue (1970, Bull. Fac. domestic Sci., Otsuma Woman's Univ. 6: 2.) 记述台湾亚种 subsp. *albofascia* (Inoue) comb. nov.。该作者认为与上述亚种的主要区别为前翅外线的白斑较宽，后翅中点极微小，后翅后缘附近的黑褐色横纹同指名亚种，黑褐色缘线较窄。Prout (1941, in Seitz, Macrolepid. World 12: 335) 曾认为保存在英国自然历史博物馆的台湾标本为指名亚种。笔者尚未见到台湾标本，但亦未能根据 Inoue 的记述鉴别其与指名亚种的稳定差异，手头指名亚种标本在上述各点特征方面均有微小变异。

细白眉亚种 subsp. *ischna* (Prout, 1938) (图版 XVII: 6)

Cidaria (*Epirrhoe*) *brephos* f. *ischna* Prout, 1938, in Seitz, Macrolepid. World 4 (Suppl.): 160, pl. 15: k. (四川：打箭炉)

Epirrhoe brephos f. *ischna*: Prout, 1941, ibidem 12: 335.

前翅长：♀ 13 mm。与前亚种比较，下唇须尖端伸达额外。前翅略狭窄，深褐色至深红褐色，外线在前缘处的白斑狭窄，中部最宽处约 1 mm，略带乳黄色，其内缘中部隆起，外缘平直。后翅中点略大，后缘附近的黑褐色条纹较弱，向上仅到达 Cu_2 处。

雌性外生殖器 (图 728)：前表皮突特别短，长度不足肛瓣长度的一半。前阴片中部较宽，上缘隆起。囊颈处的骨化带长支特别粗大，短支较细。

检视标本：1♀，云南中甸，3 120 m, 1958. VII. 30。

分布：四川、云南。

青海亚种 *subsp. nora* (Prout, 1938) (图版XVII: 7)

Cidaria (*Epirrhoe*) *brephos nora* Prout, 1938, in Seitz, *Macrolepid. World 4* (Suppl.): 160. (青海: 库库诺尔)

前翅长: ♂ 13 mm, ♀ 15 mm。下唇须尖端伸达额外。前翅黑褐色至黑色, 外线的白斑内缘平直, 外缘中部隆起。后翅斑纹近似指名亚种。前后翅反面中点明显大于前述亚种, 前翅中点位于翅中部黑线内侧, 不与该线接触。

检视标本: 1 ♀, 甘肃永登连城林场; 1 ♂, 甘肃永登吐鲁沟, 2 280 m, 1991. VII. 25—29。

分布: 甘肃、青海。

黄眉洲尺蛾 *Epirrhoe leucophoca* (Prout, 1938) (图版XVII: 8)

Cidaria (*Epirrhoe*) *leucophoca* Prout, 1938, in Seitz, *Macrolepid. World 4* (Suppl.): 160, pl. 15: k. (华西)

Epirrhoe leucophoca: Prout, 1941, *ibidem* 12: 335.




图 726—727 雄性外生殖器. 726. 弯眉洲尺蛾 *Epirrhoe lamae* (Alphéraky);
727. 流纹洲尺蛾 *E. tristata* (Linnaeus)

前翅长: ♂ ♀ 13 mm。头胸腹部颜色同白眉洲尺蛾 *E. brephos brephos* (Oberthür), 下唇须尖端伸达额外。翅面颜色和斑纹与白眉洲尺蛾极相似, 但前翅外线的白斑较宽,