

- 肾纹不明显 涟篦夜蛾 *Episparis tortuosalis*
 2. 肾纹为一白色三角形斑 白线篦夜蛾 *E. liturata*
 肾纹为一白色窄条 鳞篦夜蛾 *E. costistriga*

涟篦夜蛾 *Episparis tortuosalis* Moore (图版 LXI-19)

Episparis tortuosalis Moore, 1867, Proc. Zool. Soc. p. 81, pl. 7, fig. 5. (Bengal)

Episparis tortuosalis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 543. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 369. —Barlow, 1982, Moths SE Asia p.111.

Episparina tortuosalis: Pettetier, 1982, Ann. Soc. ent. Fr. 18: 280.

翅展 46 mm。头部黄褐色；胸部与前翅棕色，前翅带灰白并有紫色感，前缘区灰黄色，内、外及亚端线白色，环纹为一黑点，肾纹为白曲纹，中室外半有粉紫色，亚端线双线，外方一较直白线，近外缘一白线；后翅棕色带灰白，布有黑细纹，前缘区内半黄白色，外线、亚端线暗棕色；腹部褐棕色。雄蛾抱器瓣短，阳茎粗，无角状器（图 656）。




图 656 涟篦夜蛾 *Episparis tortuosalis* Moore ♂ 外生殖器

寄主 麻楝。

分布 海南、广西；锡金，印度或孟加拉国。

白线篦夜蛾 *Episparis liturata* (Fabricius) (图版 LXI-20)

Phalaena liturata Fabricius, 1787, Mant. Ins. p. 197. (印度)

Episparis liturata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 380. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 369. —Pelletier, 1982, Ann. Soc. ent. Fr. 18: 258.

翅展 38 mm。头、胸、腹及前翅黄褐色，前翅中线棕色，其余各横线白色，环纹为一黑点，肾纹白色近三角形，中线后半波浪形，前端外侧一白纹，亚端线波浪形，外

线前段与顶角间浅黄色并有棕色细点；后翅褐色，前缘区白色，外线暗棕色外弯，亚端线白色，在中褶折角，端线白色波浪形。雄蛾抱器瓣端半部宽，端缘钝圆，阳茎粗长，无角状器（图 657）。




图 657 白线篦夜蛾 *Episparis liturata* (Fabricius)
♂ 外生殖器

分布 浙江、云南；印度，缅甸，斯里兰卡，印度尼西亚。

鳞篦夜蛾 *Episparis costistriga* (Walker) (图版 LXI-21)

Amphigonia costistriga Walker, 1864, J. Proc. Linn. Soc., Zool. 7: 184. (Sarawak)

Episparis sora Swinhoe, 1889, Proc. zool. Soc. p. 415.

Episparis sora: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 544——Chen, 1982, Icon. Het. Sin, 3: 369.

Episparis costistriga: Holloway, 1976, Moths Borneo, p. 39. ——Pelletier, 1982, Ann. Soc. ent. Fr. 18: 256. pl. 2, fig. 5.

翅展 50 mm。头部褐色，雄蛾触角双栉形，栉齿细长，下唇须上缘及内侧微黄，第三节极短小；胸部背面褐色；前翅棕褐色带有灰色，内线内方色较浅，基线黑棕色，自前缘脉外斜至中室后缘，内线黑棕色，自前缘脉后内斜至中室后缘，外突成一齿再强内斜至翅后缘近基部，后半内侧色较浅，环纹只现一黑点，肾纹为一白色短条，其后端两侧各有一黄色点，外线双线黑棕色，自前缘脉外斜至 7 脉折向后呈微波浪形，5 脉后折角内斜，至亚中褶弯向后垂，亚端线黑棕色，自顶角后直线内斜至臀角，线外侧衬褐黄色，前缘区自内线至顶角一黄白相间的条纹；后翅棕褐带灰色，外线、亚端线黑棕色，均在中褶后折角，翅端区中部带白色；腹部棕色。雄蛾抱器瓣短宽，背缘近端部不规则锯齿形，阳茎粗，无角状器（图 658）。