

Moths SE Asia, p. 99. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 354.

翅展 42—45 mm。头、胸黑棕色；前翅灰褐色，有黑棕细点，亚中褶一黑棕纵条，基、内线仅前端现黑色，环纹为黑点，肾纹前、后端各一白点，中线黑色，后半波浪形，外线双线黑色，外侧在 7 脉前后各一黑纹，亚端线白色波浪形，前半内方黑棕色；后翅黑棕色，外线只现二白斑，亚端区 2—3 脉间一白斑；腹部灰黑色。雄蛾抱器瓣背端一齿突；瓣腹缘中凹（图 619）。

分布 台湾、广东、海南、广西、云南；锡金，印度，缅甸，斯里兰卡，越南，马来西亚，印度尼西亚，新加坡，大洋洲。




图 619 曲耳夜蛾 *Ercheia cyllaria* (Cramer)
♂ 外生殖器

雪耳夜蛾 *Ercheia niveostrigata* Warren (图版LIII-11)

Ercheia niveostrigata Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 335, pl. 61h. (中国)

Ercheia niveostrigata: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 354.

翅展 43 mm。头、胸褐色杂灰色，颈板外半黑褐色，中央一黑纹；前翅灰褐色，亚中褶一黑纵纹，中有白纵条，近翅后缘有一黑纵纹，翅脉黑色，均衬以褐色，翅外半的翅脉间多有长短不一的黑纵纹，内线黑色，后半不显，环纹为黑点，中线仅前端可见褐色，肾纹窄而小，外线黑色，后半波浪形并间断，前后段外侧衬黄色，近翅外缘一列黑点；后翅褐白，外线暗褐色，端区一黑褐宽带，其后半中央有一褐白曲线；腹部灰褐色。

分布 江苏、浙江、湖南、福建、四川；日本。

阴耳夜蛾 *Ercheia umbrosa* Butler (图版LIII-12)

Ercheia umbrosa Butler, 1881, Trans. ent. Soc. Lond. p. 194. (日本东京)

Melipotis strigipennis Moore, 1882, Lep. Atk. p. 165.

Ercheia umbrosa: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 494. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 354.

翅展 49 mm。头、胸暗棕色；前翅黑棕色，后缘区色浅，亚中褶及 1 脉后各一黑纵纹，内线黑色波浪形，环纹为黑点，肾纹前后端有小白点，外线后半波浪形，内侧亚中褶处有一浅褐纵条，亚端线仅后段明显白色，内侧有白影，7 脉前后各一黑纵纹，端线黑色；后翅棕色，隐约可见外线；腹部黑棕色。

分布 江西、广东、海南、贵州、四川；日本。

阿夜蛾属 *Achaea* Hübner

Achaea Hübner, [1823] 1816, Verz. Bek. Schmett. p. 296.

Type-species: *Phalaena melicerta* Drury.

Geria Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1366.

喙发达，下唇须向上伸，第二节约达头顶，额平滑，复眼圆大，雄蛾触角有纤毛；胸部毛鳞混生，无毛簇；前足及后足胫节有长毛，前足胫节无刺，中后足胫节有刺；腹基部几节有毛簇；前翅前缘端部拱垂，外缘曲度平稳，成波浪形，有副室；后翅中室约为翅长的 $1/3$ 。

种 检 索 表

前翅内线外、线明显 飞扬阿夜蛾 *Achaea janata*
前翅内线、外线不明显 人心果阿夜蛾 *A. serva*

飞扬阿夜蛾 *Achaea janata* (Linnaeus) (图版LIII-13)

Phalaena Geometra janata Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10): 527. (“Indies”)

Phalaena Noctua melicerta Drury, 1773 1770, Ill. exot. Ins. 1: 46.

Achaea melicerta: Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 480. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 354.

翅展 51—54 mm。头、胸灰黄褐色；前翅浅灰褐色，基线黑色外斜，内线双线黑棕色波浪形，外斜，肾纹前、后端各一黑点，中线暗褐色波浪形，外线黑色，与中线近平行，内侧一暗褐窄带，亚端线灰白色波浪形，端线黑色；后翅棕黑色，基部灰褐，中部一楔形白带，外缘有三个白斑，臀角有一白窄纹。

寄主 蓖麻、飞扬草。

分布 山东、湖北、湖南、台湾、福建、广东、广西、云南；日本，印度，缅甸，南太平洋若干岛屿，大洋洲。

人心果阿夜蛾 *Achaea serva* (Fabricius) (图版LIII-14)

Noctua serva Fabricius, 1775, Syst. Ent. p. 593. (澳大利亚)

Achaea serva: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 521. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 480. —Barlow, 1982, Moths SE Asia, p. 98. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 354.

翅展 62—80 mm。头、胸及前翅棕褐色，前翅内线黑棕色波浪形外斜，环纹为一