

部褐色。雄蛾外生殖器似聂拉木冥夜蛾，但阳茎端基环宽扁，阳茎较粗（图 302）。

分布 四川、云南。

会冥夜蛾 *Erebophasma vittata* (Staudinger) (图版 XVI-5)

Agrotis vittata Staudinger, 1895, Iris, 8: 314, pl. 5, fig. 15. (青海湖与罗布泊之间地区)

Agrotis agama Staudinger, 1895, Iris, 8: 314, p. 315.

Erebophasma vittata: Boursin, 1964, Ver. zool. Staat. munch. 8: pl. 10, fig. 37. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 284.

翅展 31mm。头、胸、前翅褐色，颈板浅灰色，头顶饰长毛；前翅前缘区较灰白或带赭黄色，中脉白色衬灰白色，后部或衬赭黄色并在中部伸出一短枝，中室大部黑色，环、肾纹灰白，前者很小，后者后端内伸，外侧黑色，锯齿形外伸，亚端线由黑点列成；后翅与腹部浅褐色。雄蛾抱器瓣无突起物，阳茎端部有一具齿的圆钝几丁质片（图 303）。




图 303 会冥夜蛾 *Erebophasma vittata* (Staudinger) ♂ 外生殖器

分布 青海、四川、西藏。

连纹冥夜蛾 *Erebophasma conjunctiva* Chen (图版 XVI-6)

Erebophasma conjunctiva Chen, 1984, Acta ent. Sin. 27 (3): 328, fig. 5. (康定)

翅展 30mm。头部与胸部淡黄褐色，下唇须外侧黑褐色，颈板淡黄色，基部黑色；前翅褐色，前缘区内半淡褐黄色，中室黑色，基部浅褐黄色，中室后缘浅褐黄色，其中部向后分出一短支，亚中褶基部有一黑色纵纹，环纹淡黄色，近三角形，其外后端与肾纹相接，肾纹新月形，淡黄色，中有暗褐曲纹，亚端线隐约可见，不规则锯齿形，端线黑褐色；后翅黄褐色；腹部黄褐色。




图 304 连纹冥夜蛾 *Erebophasma conjunctiva* Chen ♂ 外生殖器

雄性外生殖器的钩形突短宽，端部平，抱器瓣长，端部中凹，瓣背缘有一丘形突起（图 304）。

分布 四川。

冥夜蛾 *Erebophasma haematina* Boursin (图版 XVI-7)

Erebophasma haematina Boursin, 1963, Forsch. Ber. Lands. Nordrhein-Westf. 1170: 75, pl. 4, fig. 79, pl. 19, fig. 72. (四川巴塘)

Erebophasma haematina: Chen *et al.*, 1991, Noct. Fn. Xizang p.146. Chen, —1984, Acta




图 305 冥夜蛾 *Erebophasma haematina* Boursin ♂ 外生殖器