

形，外一线前段扩展，亚端线双线波浪形，稍间断，端区有一些浅褐短纹；后翅中线弧形，外线、亚端线均双线波浪形，各横线均棕黑色；雄蛾后翅前缘反卷。

分布 福建、江西、广东、海南、四川、云南；日本，印度，锡金，尼泊尔，缅甸，斯里兰卡，加里曼丹。

玉边目夜蛾 *Erebus albicinctus* Kollar (图版 L-3)

Erebus albicinctus Kollar, 1844, in Kollar et Redtenbacher, Hugel's Kashmir 4: 474. (Himalay, Massuri)

Nyctipao albicincta: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 288. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 461.

Erebus albicincta: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 350.

翅展 100mm。全体黑褐色，前翅带蓝紫色，中部一大眼斑，其内半褐色黑边，外半一黑色肾形斑，中有二粉蓝点，后端一粉蓝曲线，黑斑围以暗绿弧纹，其中一暗线，外线粗，白色，微锯齿形外弯，在 1 脉后内弯，端区翅脉及缘毛白色；后翅外半带蓝紫色，外线粗，白色锯齿形，端区翅脉及缘毛白色。

分布 台湾、四川、贵州、云南；印度，缅甸。

闪目夜蛾 *Erebus glaucopis* (Walker) (图版 L-4)

Nyctipao glaucopis Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1306. (Bengal)

Nyctipao prunosa Moore, 1883, Proc. zool. Soc. p. 26.

Nyctipao glaucopis: Hampson, 1894, Fn. Br. Ind. 2: 461. —Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 291. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 461, pl. 56b. —Draudt, 1950, Mitt. munch. ent. Ges. 40: 152. —Chen, 1993, Ins. Hengduan Mts. p. 1022.

翅展 80 mm。头部与胸部黑褐色；前翅褐色，除基部外均带有紫蓝色，中部有一眼形大斑，其内半绿褐色弯钳形，黑边，并有少许蓝白细点，外半黑色，其外侧围以灰绿色边，眼斑外侧有一黑色外曲线，自亚前缘脉绕过眼斑至其后端，折向后行并渐弱，外线灰白色，自前缘脉后外斜，在 6 脉及 4 脉后各成一外凸齿，其后内斜达 1 脉；后翅亚端线内方黑褐色，后缘区及端区黑褐色带紫蓝色，外线白色，在前缘后较粗，呈双白圆斑，其后细，波浪形，缘毛褐色；雌蛾后翅紫蓝色，基部褐色；腹部黑褐色。

分布 云南；印度，孟加拉国。

目夜蛾 *Erebus crepuscularis* (Linnaeus) (图版 L-1)

Phalaena Noctua crepuscularis Linnaeus, 1758, Syst. Nat. (Edn 10): 509. (“America”)

Nyctipao leucotaenia Guenée, 1852, Hist. nat. Ins. Noct. 3: 509.