

羊目夜蛾 *Erebus caprimulgus* (Fabricius) (图版 XLIX-7)

Noctua caprimulgus Fabricius, 1775, Syst. Ent. p. 591. (中国)

Nyctipao caprimulgus: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 277. ——Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 459. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 350.

翅展 80mm。头、胸及腹部黑棕色。雄蛾前翅黑棕色，仅肾纹与中线明显，前者似眼形大斑，中线黑色。雌蛾前翅黑棕色，基部微带紫色，端区色浅，内线黑色锯齿形，肾纹模糊，中线黑色，半圆形外弯绕过肾纹至 2 脉基部，折向后行，外弯部分两侧黑色，与肾纹间亦黑色，外线前端为棕色方块，外侧灰白色，亚端线白色波浪形，有间断，两侧黑色；后翅黑棕色，内线黑色，外线外侧白色，亚端线两侧有白波浪纹，后半几汇成一片。

分布 海南、云南；印度，缅甸。

空目夜蛾 *Erebus aerea* (Swinhoe) (图版 L-1)

Argiva aerea Swinhoe, 1900, Cat. East & Austral. Lep. Het. p. 116. (印度尼西亚)

Nyctipao aerea: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 282, pl. 205, fig. 5. ——Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 465, pl. 45c.

Eupatula aerea: Chen, 1985, Econ. Ins. Fn. China, Lep. Noct. 4: 133.

翅展 82mm 左右。全体黑棕色；前翅内线微黑，后半外弯，肾纹与中线前半成一眼形斑，肾纹褐色黑边，外衬黄色，外方一模糊黑斑，其后部有蓝白色尖纹，位于肾纹后外端二齿之外，中线半外弯，黑色，在亚中褶前折向后行，微波曲，外线极模糊，色暗，波浪形外弯，亚端线只现一些暗纹，在 5 脉后微内斜；后翅可见一外斜中线，雄蛾后翅前缘向上翻折，其上着生褐黄色长绒毛。

分布 云南；印度尼西亚。

卷裳目夜蛾 *Erebus macrops* (Linnaeus) (图版 L-2)

Phaluena Attacus macrops Linnaeus, 1770, Syst. Nat. 12 (3), App. p. 225. (1768). (印度 Orientali)

Nyctipao macrops: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 284. ——Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 460.

Eupatula macrops: Holloway, 1976, Moths Borneo. p. 29. ——Chen, 1982, Icon. Het Sin. 3: 351.

翅展 108mm。全体暗褐色；前翅各横线棕黑色，基线外侧有一棕黑影，内线双线，内一线外斜至亚中褶后波浪形，外一线中段不显，翅中部一大眼斑，由肾纹及一黑弧线合成，肾纹后部膨大并外展，后半及端部有银蓝纹，弧线与肾纹间黑色，外线双线波浪