

6. 雄蛾后翅有香鳞 7
 后翅无香鳞 8
7. 除端部外均有香鳞覆盖 毛目夜蛾 *E. pilosa*
 香鳞覆盖翅的内 2/3 9
8. 前翅有亚顶斑 目夜蛾 *E. crepuscularis*
 前翅无亚顶斑 玉线目夜蛾 *E. gemmans*
9. 后翅香鳞覆盖至后缘 玉边目夜蛾 *E. albicincta*
 后翅香鳞覆盖至 1 脉 闪目夜蛾 *E. glaucopis*

眉目夜蛾 *Erebus hieroglyphica* (Drury) (图版 XLIX-5)

Phalaena Noctua hieroglyphica Drury, 1773, Ill. exot. Ins. 2: 3, pl. 2, fig. 1. (印度)

Nyctipao hieroglyphica: Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 275. —Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 459. —Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 350.

翅展 68mm。头、胸、腹及前翅黑棕色；前翅端区色较浅，有暗棕细纹，肾纹黄褐色黑边，后端及外缘有银白纹，中线黑色，半圆形绕过肾纹至 2 脉基部再内斜，外线前段为外斜中凹的黄条，4 脉后有一小黄斑，亚端线隐约可见波浪形，缘毛波曲；后翅黑棕色。雌蛾暗灰褐色，翅有黑棕细纹，肾纹带有白色，外线前段为白斜条，4 脉后一白斑；后翅可见黑棕色内线，外线带有白色。

分布 广东、海南、云南；印度，缅甸，斯里兰卡，菲律宾，印度尼西亚，新加坡。

波目夜蛾 *Erebus orion* (Hampson) (图版 XLIX-6)

Nyctipao orion Hampson, 1913, Cat. Lep. Phal. Br. Mus. 12: 279, pl. 204, fig. 8. (Borneo: Trusan)

Nyctipao orion: Gaede, 1938, in Seitz, Macrolep. World 11: 460, pl. 45b.

Erebus orion: Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 350. —Chen, 1992, in Peng, Icon. For. Ins. Hunan p. 1011.

翅展 80mm。雌蛾头部与胸部黑棕色；前翅除亚端区外均黑棕色，肾纹褐色，后端呈双齿形外伸，黑边，有银白色细线，中线黑色，波浪形，绕过肾纹，外线微白，不规则波浪形，内侧色黑，前端内侧约呈方形，亚端线不清晰，色浅，波浪形，前端有一黑斑，外线与亚端线间色浅，有银白色细纹；后翅黑棕色，外半部色浅，有深棕色细纹，内线白色，波浪形，中线细波浪形，内侧色稍黑，外线与亚端线不清晰，合成波浪形浅褐色宽带；腹部黑棕色。

分布 云南；印度尼西亚等。