

南夜蛾属 *Ericeia* Walker

Ericeia Walker, [1858] 1857, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 13: 1089.

Type-species: *Ericeia sobria* Walker.

Girpa Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 15: 1849.

Villosa Koch, 1865, Indo-Austral. Lep. Fn. p. 108.

喙发达，下唇须向上伸，第二节近达头顶，第三节中常，较细，雄蛾触角有纤毛。胸部毛与鳞片混生，雄蛾中足胫节有一褶沟，后足有长毛簇伸至跗节端部，前翅宽，顶角稍尖，外缘微波浪形。

种 检 索 表

- 1. 前翅亚端线与外线间成一暗带..... 暗带南夜蛾 *Ericeia eriophora*
前翅亚端线与外线间不成暗带 2
- 2. 前翅亚顶斑不显 伯南夜蛾 *E. fraterna*
前翅亚顶斑明显 3
- 3. 前、后翅反面的亚端线间断..... 断线南夜蛾 *E. pertendens*
前、后翅反面的亚端线不间断 中南夜蛾 *E. inangulata*

暗带南夜蛾 *Ericeia eriophora* (Guenée) (图版LVII-4)

Hulodes eriophora Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins. 7: 210. (印度)

Ophisma deficiens Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus. 14: 1383.

Remigia perfidiosa Walker, 1858, List Spec. Lep. Colln Br. Mus.

Hypopyra apicalis Walker, [1863] 1864, J. Linn. Soc. 7: 178.

Ericeia eriophora: Barlow, 1982, Moths SE Asia p. 109, pl. 37, fig. 8.

翅展 45 mm。头部与胸部灰褐色，雄蛾中足胫节有长毛丛；前翅灰褐色，布有零星暗褐点，基线仅在前缘区现一黑褐外斜曲纹，内线在前缘区为一外斜条，在 1 脉处为一黑褐纹，环纹不显，肾纹黑褐色，窄长而斜曲，后端伸出中室，前方有一黑褐小斑，外线双线黑褐色，锯齿形外弯，4 脉后强内突达肾纹后端，内侧在中褶处有一模糊黑褐环，外侧在 6 脉前另一有黑褐波曲线，亚端线双线黑褐色，在 7 脉处外凸，其后直线内斜，在 4 脉处成一外突齿，在亚中褶后波曲，外线与亚端线间暗褐色，前缘脉上有一列黄白点，亚中褶后有一模糊黑斑，其上有白鳞，近翅外缘有一列黑点，端线黑色，有间断，顶角外突而尖；后翅灰褐色，隐约可见暗褐色中线，近呈直线内斜，外线黑褐色，细锯齿形，有间断，中段外弯，亚端线为一模糊褐色带，全翅散布黑褐细点，近翅外缘有一列黑点，端线黑色，有间断；腹部灰褐色。

分布 云南；印度。

伯南夜蛾 *Ericeia fraterna* (Moore) (图版LVII-2)

Girpa fraterna Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 94, pl. 156, fig. 5. (斯里兰卡)

Ericeia fraterna: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 363, pl. 66a. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 363.

翅展 49 mm。头、胸、腹及前翅褐灰色；前翅基线与内线黑褐色，后者波浪形微内斜，间断为粗点列，环纹小，黑褐色，肾纹褐色，轮廓不甚清晰，外线黑褐色，间断为点列，自前缘脉后外弯，在中褶处内凸，4脉处内伸近中室下角，其后波曲内斜，亚端线黑褐色，在7脉与4脉处各为一外凸钝齿，中褶与亚中褶处为内凸齿，线内侧各翅脉间有黑褐斑，合成一不清晰的宽带，近翅外缘有一列小黑点，顶角有一黑褐斜纹；后翅褐灰色，中线暗褐色，在中室折角，外线为双线黑褐点，亚端线双线暗褐色，近外缘有一列黑点；腹部褐灰色。

断线南夜蛾 *Ericeia pertendens* (Walker) (图版LVII-5)

Remigia pertendens Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 12: 1512. (斯里兰卡)

Ericeia pertendens: Holloway, 1976, Moths Borneo p. 33. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 868.

翅展 45mm。头、胸、腹及前翅浅褐灰色；前翅基、内线黑色，后者后半细波浪形，有间断，环纹不显，肾纹小，褐色，不清晰，中线粗而模糊，褐色，外线极弱，由褐点组成，亚端线粗，暗褐色，在3脉处成一明显外突齿，5脉前有一列黑褐斑位于内侧，1脉前有一大黑褐圆斑，1脉后有一黑点，均位于内侧，顶角有一暗褐纹内斜至亚端线，近翅外缘有一列黑点；后翅褐灰色，一黑褐线自中室下角达翅后缘，外线仅中褶后明显，由一系列黑褐点组成，亚端线双线暗褐色，波浪形，不清晰，内一线波曲，线间色暗，似带状。

分布 海南、云南；斯里兰卡，印度尼西亚。

中南夜蛾 *Ericeia inangulata* (Guenée) (图版LVII-6)

Hulodes inangulata Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 210. (Bengal)

Girpa inangulata: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 94.

Ericeia inangulata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 366. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 363. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 867.

翅展 50 mm。头、胸及前翅灰褐色，基、内线波浪形，黑色，后者微弱并间断，环纹只现一黑点，中线模糊，黑色，肾纹暗褐色，外线黑色，波浪形，隐约可见双线，