

分布 云南；印度。

伯南夜蛾 *Ericeia fraterna* (Moore) (图版LVII-2)

Girpa fraterna Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 94, pl. 156, fig. 5. (斯里兰卡)

Ericeia fraterna: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 363, pl. 66a. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 363.

翅展 49 mm。头、胸、腹及前翅褐灰色；前翅基线与内线黑褐色，后者波浪形微内斜，间断为粗点列，环纹小，黑褐色，肾纹褐色，轮廓不甚清晰，外线黑褐色，间断为点列，自前缘脉后外弯，在中褶处内凸，4脉处内伸近中室下角，其后波曲内斜，亚端线黑褐色，在7脉与4脉处各为一外凸钝齿，中褶与亚中褶处为内凸齿，线内侧各翅脉间有黑褐斑，合成一不清晰的宽带，近翅外缘有一列小黑点，顶角有一黑褐斜纹；后翅褐灰色，中线暗褐色，在中室折角，外线为双线黑褐点，亚端线双线暗褐色，近外缘有一列黑点；腹部褐灰色。

断线南夜蛾 *Ericeia pertendens* (Walker) (图版LVII-5)

Remigia pertendens Walker, 1858, List Spec. Ins. Colln Br. Mus. 12: 1512. (斯里兰卡)

Ericeia pertendens: Holloway, 1976, Moths Borneo p. 33. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 868.

翅展 45mm。头、胸、腹及前翅浅褐灰色；前翅基、内线黑色，后者后半细波浪形，有间断，环纹不显，肾纹小，褐色，不清晰，中线粗而模糊，褐色，外线极弱，由褐点组成，亚端线粗，暗褐色，在3脉处成一明显外突齿，5脉前有一列黑褐斑位于内侧，1脉前有一大黑褐圆斑，1脉后有一黑点，均位于内侧，顶角有一暗褐纹内斜至亚端线，近翅外缘有一列黑点；后翅褐灰色，一黑褐线自中室下角达翅后缘，外线仅中褶后明显，由一列黑褐点组成，亚端线双线暗褐色，波浪形，不清晰，内一线波曲，线间色暗，似带状。

分布 海南、云南；斯里兰卡，印度尼西亚。

中南夜蛾 *Ericeia inangulata* (Guenée) (图版LVII-6)

Hulodes inangulata Guenée, 1852, in Boisduval et Guenée, Hist. nat. Ins., Noct. 3: 210. (Bengal)

Girpa inangulata: Moore, 1884—1887, Lep. Ceyl. 3: 94.

Ericeia inangulata: Warren, 1913, in Seitz, Macrolep. World 3: 366. ——Chen, 1982, Icon. Het. Sin. 3: 363. ——Sugi, 1982, in Inoue et al., Moths Jap. 1: 867.

翅展 50 mm。头、胸及前翅灰褐色，基、内线波浪形，黑色，后者微弱并间断，环纹只现一黑点，中线模糊，黑色，肾纹暗褐色，外线黑色，波浪形，隐约可见双线，